

療效或效果

足癬、股癬、體癬

用法及用量

請1天1次，適量地噴擦於患處。

請務必遵守規定用法、用量。

請勿在患部和其周圍髒污的情況下使用。

請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗，立刻接受眼科醫師的診療。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

請只使用於外用。

請避免以沾有本藥劑的雙手觸摸眼部及黏膜。

使用前請充分搖勻

請於與患部距離約10cm的位置下進行噴射。此外，請確實確認噴口位置，避免朝臉部，特別是眼部噴射或吸入

請勿朝同一部位連續噴射超過1秒。(本藥劑冷卻力強，過度使用可能造成凍傷)

成分及分量

90 g 中

Terbinafine Hydrochloride 135mg

Lidocaine 270mg

Glycyrrhetic Acid 67.5mg

l-Menthol 135mg

添加劑

Sorbitan sesquioleate ,Octyldodecyl myristate,Anhydrous ethanol,Magnesium carbonate ,Titanium oxide,Magnesium aluminometasilicate ,Corn starch ,LPG,Isopentane

使用上的注意事項**禁止事項**

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

●下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

請勿用於下列部位。

眼睛和眼睛周圍、黏膜(例如：口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部位等。

濕疹

浸潤、潰爛、龜裂和外傷嚴重的患部。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

嬰兒、幼童。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

患部在臉部或廣範圍的人。

患部正在化膿的人。

不確定是「濕疹」或「足癬、股癬、體癬」的人。(陰囊有發癢、潰爛等症狀的情況下，大多是濕疹等原因所造成。)

●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，手持本容器，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：斑疹、刺激感、灼熱感、鱗屑、脫屑(皮屑、皮垢般的皮膚碎片)、潰爛、乾燥、緊繃感、皮膚龜裂、疼痛、色素沉澱、出疹、發紅*、搔癢*、腫脹*、蕁麻疹*(*)：可能出現於全身。)

使用2週左右症狀仍未見改善時或因使用本藥劑而使症狀惡化時，請停止使用並手持本容器諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

請勿使用超過使用期限的產品。(為確保品質)

請遠離火源。

本藥劑沾附地板、家具等塗層可能造成其變質，因此使用時請注意避免沾附。

殘留量較少時，將藥罐橫放使用可能造成藥劑難以釋出

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。