

ダマリングランデパウダースプレー

指定第二类医薬品
水虫・たむし用薬

効能・効果

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。
定められた用法・用量を厳守してください。
患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
外用にのみ使用すること。
本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
使用前によく振ってください
患部まで約10cmの距離で噴射してください。なお、噴射口をよく確かめ、顔面、特に目に向けて噴射したり、吸入しないでください
同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。（本剤は冷却力が強いいため、過度の使用により凍傷になる恐れがあるため）

成分及び分量

90g中
テルビナフィン塩酸塩 135mg
リドカイン 270mg
グリチルレチン酸 67.5mg
l-メントール 135mg

添加物

ソルビタンセスキオレイン酸エステル,ミリスチン酸オクチルドデシル,エタノール,炭酸マグネシウム,酸化チタン,メタケイ酸アルミン酸マグネシウム,トウモロコシデンプン,LPG,イソペンタン

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
● 次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
湿疹
湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

● 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
妊婦又は妊娠していると思われる人。
乳幼児。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
患部が顔面又は広範囲の人。
患部が化膿している人。
「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）
● 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤
、かゆみ、はれ*、じんましん*（*：全身に発現することもあります。）
2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
小児の手のとどかない所に保管してください。
他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。（品質保持のため）
火気に近づけないでください。
本剤は床、家具等の塗装面に付きますと変質させることがありますので、付着しないよう取扱いに注意してください。
残量が少なくなった時、缶を横にして使用すると、出にくくなる場合があります

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。