

效能或效果

脚癣、股癣、体癣

用法及用量

1天1次，请取适量喷射涂抹于患处。
 请严格遵守规定的用法用量。
 患处或周围不干净时不要使用。
 注意不要入眼。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗，并及时前往眼科就诊。
 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
 仅限外用。
 请勿用粘着本药剂的手触摸眼睛或粘膜部位。
 使用前请摇匀，并向正下方喷射。
 喷射时请保持离患处大约3cm的距离。
 喷射时请勿对着同一部位连续喷射超过1秒。（本药剂冷却力很强，过量使用可能会有冻伤的危险）

成分及分量

60 g 中
 Terbinafine Hydrochloride 240mg
 Lidocaine 480mg
 Glycyrrhetic Acid 120mg
 l-Menthol 240mg

添加剂

Polysorbate 65, Monostearate polyoxyethylene sorbitan, Polyoxyethylene stearyl ether, Cetanol, Hydroxypropylcellulose, 1,3-Butylene glycol, BHT, Anhydrous ethanol, DME

使用注意事项**禁止事项**

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
 ● 下述人群不要使用
 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
 请不要用于下述部位。
 眼睛周围、粘膜（例如：口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴部等
 湿疹
 湿润、糜烂、开裂或外伤严重患处

咨询事项

● 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 正在接受医师治疗的人群
 孕妇或有其可能性的人群
 婴幼儿
 因药物等出现过过敏症状的人群
 患处位于脸部或范围较大的人群
 患处化脓的人群。
 无法明确是“湿疹”或“脚癣、股癣、体癣”的人群。（阴囊存在发痒或糜烂等症状时，由湿疹等引起的情况较多。）
 ● 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并请持本容器咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 皮肤：斑疹、刺激感、发热、鳞屑掉屑（头皮屑、头垢类的皮肤脱落）、糜烂、干燥发胀感、皮肤皴裂、痛感、色素沉着、起疹和发红*、发痒*、肿胀*、荨麻疹*（*：也有可能出现在全身。）
 使用2周左右后仍不见症状改善或使用本药剂后症状恶化时，请停止使用，并请持本容器咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所
 请保管在儿童无法触及的地方。
 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
 请勿使用超过使用期限的产品。（为了保证质量）
 请勿靠近烟火。
 本药剂附着在地板、家具等喷漆面会发生变质，使用时请注意。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任