

2019年4月

大正製薬株式会社

エパデールT 添付文書改訂のお知らせ

本製品の添付文書を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

改訂内容

改訂前	改訂後（___：改訂箇所）
<p>「服用にあたっての重要な注意」 ○中性脂肪異常の改善には、生活習慣の改善（食事・運動・禁煙）をあわせておこなうことが大切です。</p> <p>「用法・用量」 [注意] （6）本剤の服用3ヵ月後には、健康診断等で血液検査を行い、中性脂肪値の改善を確認することをお勧めいたします。</p>	<p>「服用に関する重要な注意」 ○中性脂肪異常の改善には、生活習慣の改善（食事・運動・禁煙）をあわせておこなうことが大切です。 <u>○医療機関等における血液検査の結果として、中性脂肪値の改善がみられない場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</u></p> <p>「用法・用量」 [注意] （6）本剤の服用開始3ヵ月後には、<u>医療機関等で血液検査を行い、中性脂肪値の改善を確認してください。</u> <u>血液検査にあたっては、中性脂肪値に影響を及ぼすため、検査前10時間以上は、水以外の飲食物を摂取しないようにする必要があります。</u></p>

以上