

◆Epadel T的主要成分为ethyl icosapentate，是改善在体检等检查时指出的已达到临界值的中性脂肪值的药物。◆中性脂肪异常是脂质代谢的均衡破坏导致血液中的中性脂肪异常增加的状态，改善中性脂肪异常，可以减少生活习惯病或心血管疾病等动脉硬化疾病的发病风险。◆Ethyl icosapentate具有控制肝脏中合成过剩的中性脂肪、促进血液中过剩中性脂肪的代谢以改善中性脂肪高值的作用。此外，作为其他作用，具有保持动脉的柔软弹性的作用或，控制血小板的凝聚引导血流通畅的作用。

服用时的重要注意事项

○为了改善中性脂肪的异常，配合改善生活方式（饮食、运动、戒烟）是非常重要的。○在医疗机构接受血液检查如果结果未见中性脂肪值改善时，请停止服用并携带本药物说明书咨询医生或药剂师。

效能或效果

在体检等检查时医生指出已达临界值（注释）的中性脂肪值的改善

（注释）“临界值”：指体检等检查时测出中性脂肪稍微高于正常值的数值（150mg/dL以上且未滿300mg/dL）。

〔注意〕

曾经被诊断为心绞痛、心肌梗塞、脑中风的人群、因血脂异常症（高血脂）、糖尿病、高血压症而正在治疗中的人群或医生建议治疗的人群，请勿服用本药。

用法及用量

请在饭后马上服用以下的量。

20岁以上：1包：1天3次 饭后马上

未滿20岁：请勿服用

〔注意〕

请严格遵守规定的用法用量。

空腹时服用成分不易吸收，因此请饭后马上服用。

服用时请不要咀嚼。（因为是软质胶囊，如果咀嚼会渗出油成分）

为了改善中性脂肪异常值必须连续服用4周以上。

本药剂服用时间的标准（效果稳定）为3~6个月。

本药物开始服用*三个月后，应在医疗机构*等接受血液检查，确认中性脂肪值的改善情况。☞在血液检查时，为了避免影响中性脂肪值的检查结果，应在检查前十小时以上，不能摄取除水以外的食物和饮料。

成分及分量

1包中

Ethyl icosapentate 600mg

添加剂

Tocopherol ,Gelatin,D-Sorbitol ,Glycerin,Butyl parahydroxybenzoate

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

●下述人群请不要服用

未滿20岁的人群。

有出血症状的人群。（血友病、毛细血管脆化症、消化道溃疡、尿道出血、咯血、玻璃体出血等有出血症状时，有可能会发生止血困难）

容易出血的人群。（可能会助长出血）

预定做手术的人群。（可能会助长出血）

服用下述药物的人群。

含warfarin等的抗凝血药，含有aspirin的感冒药、止痛退烧药、抗血小板药，含indometacin的止痛消炎药， ticlopidine hydrochloride 或cilostazol等的抗血小板药（有可能加重出血倾向）

被诊断为血脂异常症（高血脂）、糖尿病或高血压病且正在接受医生治疗的人，或接受体检等医生建议接受治疗的人群。

父母、兄弟姐妹中有被诊断为原发性高血脂的人的人群。

曾有被诊断为心绞痛、心肌梗塞、脑中风的人群。

孕妇或有其可能性的人群

处于哺乳期的人群。（通过动物实验确认会转移到乳汁中）

咨询事项

●下述人群请在服用前咨询医生或药剂师

正在接受医师治疗或服用其他药物的人群。

因药物等引起过过敏症状的人群。

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

皮肤：起疹、发痒、粉刺

消化系统：恶心、腹部不适、腹痛、呕吐、食欲不振、口腔溃疡、腹部胀满感、烧心、胀气

呼吸系统：咳嗽、气闷、气短

精神神经系统：头痛、头晕、发晕、失眠、嗜睡、发麻

肾脏：脸部浮肿、眼睛浮肿、尿量减少、尿频

血液：皮下出血、易出血（牙龈出血、鼻血、血尿等）、眼底出血（视力下降、看到明亮墙面时感觉有蚊子飞）、消化道出血（吐血、带血的粪便等）、贫血症状（头晕、头痛、耳鸣等）

循环系统：心悸

其他：发烫、脸部灼热发红、发烧、关节痛、肌肉痛、四肢疼痛、肌肉痉挛（小腿肚抽筋等）、浮肿、全身无力、女性化乳房（男性出现女性型乳房）

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

●服用后若出现月经量变多、长时间持续出血时，应立即停止服用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

●服用后有可能出现下述症状，如果这些症状持续或加重，请停止服用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

腹泻、便秘、口腔干燥

●服用3~6个月后的血液检查中，中性脂肪值仍未改善时，请停止服用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

41

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任