

◆ Herpecia Cream為含抗病毒藥acyclovir成分，預防口腔皰疹復發的藥品。■唇部或唇周出現刺麻、刺痛等不適感時及早治療效果更佳。

## 療效或效果

口腔皰疹復發（僅限曾接受醫生診斷、治療者）

## 用法及用量

請1天3~5次，適量地塗抹於患處。

唇部或唇周感到刺麻、刺痛等不適感時請立即塗抹。

請務必遵守規定用法、用量。

兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。

僅供外用。

入口雖不會造成危害，但請盡量避免置入口中或舔食。

## 成分及分量

1 g 中  
Aciclovir 50mg

## 添加劑

Glycerin, Dimethylpolysiloxane, Stearyl alcohol, Propylene glycol, Liquid paraffin, l-Menthol, Sorbitan stearate, Polysorbate 60, Butyl parahydroxybenzoate, citric acid, Sodium citrate

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

符合下列情形者請勿使用。

被認為是初次發病者、患部範圍較大者。（初次發病者症狀可能較為嚴重，患部範圍較大者屬於重症患者，因此請尋求醫師診治）

曾因本藥劑、本藥劑成分或valacyclovir製劑引發過敏症狀者。（可能因使用本藥劑而再次引發過敏症狀）

未滿6歲的嬰幼兒。（嬰幼兒初次感染的可能性較高）

請勿用於下列部位。

眼睛和眼部周圍。（不慎入眼，可能引起刺激）

除嘴唇及唇周以外的部位。（口腔皰疹長於嘴唇及唇周）

### 諮詢事項

符合下列情形者請在使用前諮詢醫師或藥劑師

正在接受醫生治療者。（可能影響醫師的處方用藥或使用與本藥劑成分相同的藥物）

孕婦或可能懷孕者。（應謹慎用藥，需要諮詢專科醫師並接受其指示）

哺乳中的婦女。（相同成分的醫療用口服藥試驗證明藥物成分會轉移到乳汁內）

曾因藥物等引發過敏症狀者。（曾因藥物等引發過敏症狀者服用本藥劑亦可能造成過敏反應）

浸潤或潰爛嚴重者。（若症狀嚴重，需要諮詢專科醫生並接受有關指示）

異位性皮膚炎患者。（因可能導致症狀加劇，需要諮詢專科醫生並接受其指示）

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

皮膚：出疹、發紅、腫脹、搔癢、斑疹、刺激感、疼痛、乾燥、灼熱感、脫屑（皮屑、皮垢般的皮膚碎片）、蕁麻疹

（可能為本藥劑所引發的過敏症狀或由於本藥劑藥理作用過強所引發的症狀，如果是這樣的情況，持續使用同一藥物將可能造成症狀惡化）

使用5天左右症狀仍未見改善甚或症狀惡化時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

（如使用5天症狀仍未見改善，可能症狀過於嚴重或為其他疾病，因此應儘早諮詢醫師或藥劑師）

## 保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

使用前後請仔細清洗雙手。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內使用完畢。（為確保品質）

**【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。