

## アイリスCL-Iネオ

◆アイリスCL-Iネオは、タウリンを配合した涙液型目薬です。□タクトレンズ□たまま点眼□タクトレンズに吸着して蓄積され、変性の原因となる成分を配合していません。  
□だから、ソフト、ディスポーザブルをはじめO2、ハードコンタクトレンズを装着したまま、安心して点眼でき、コンタクトレンズをした目をやさしくいたします。□Eアイ点眼□目のかわき □乾いた目への刺激やトラブルの一因と言われている防腐剤を配合せず、涙の成分（塩化ナトリウム、塩化カリウム）にタウリンを配合。だから、乾いた目にうるおいと栄

## 効能・効果

目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。  
定められた用法・用量を厳守してください。  
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。  
点眼用にのみ使用してください。  
無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。  
本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。

## 成分及び分量

アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1%  
塩化ナトリウム 0.56%  
塩化カリウム 0.113%

## 添加物

炭酸水素ナトリウム,pH調節剤

## 使用上の注意

## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
次の症状のある人。  
はげしい目の痛み  
次の診断を受けた人。  
緑内障  
使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：  
発疹・発赤  
かゆみ  
目：  
充血  
かゆみ  
はれ
- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
目のかすみが改善されない場合。  
2週間位使用しても症状がよならない場合。

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光を避け、涼しい所に保管してください  
小児の手のとどかない所に保管してください。  
他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）  
他の人と共用しないでください  
車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。（容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります）  
ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。  
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。