

使用前請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以備不時之需。



舒緩眼睛疲勞、視力模糊、眼睛發癢

IRIS

第三類醫藥品
(眼藥水)

- ◆ IRIS 有效緩解眼睛疲勞、視力模糊、眼睛發癢等症狀，點眼後清涼舒爽。
- ◆ 使用電腦、開車所導致的眼睛疲勞或受塵埃、泳池含氯刺激所造成的不適症狀皆以及早治療為佳。



使用上的注意事項



諮詢事項



1 下列人士使用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1)正在接受醫師治療者。
- (2)曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (3)有下列症狀的人。
劇烈的眼睛痛
- (4)受診斷為患有下列疾病者。
青光眼

2 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

3 若有以下狀況請停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1)視力模糊沒有改善的情況下。
- (2)即使使用 2 週左右，症狀也沒有改善的情況下。

療效

眼睛疲勞、視力模糊（眼屎多時等）、眼睛癢、結膜充血、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、因紫外線等光線所造成的眼炎（雪眼炎等）、預防眼病（游泳之後、灰塵和汗水跑進眼睛時等）、配戴硬式隱形眼鏡時的不適感

在這些時候



舒緩使用電腦時等的
眼睛疲勞與充血



舒緩開車所導致的眼睛
疲勞



游泳後預防眼病

用法及用量

1 天 3~5 次，1 次點眼 2~3 滴。

[注意]

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。
- (5) 僅供點眼使用。

成分

成分	分量	效用
硫酸甲酯新斯狄明	0.002%	改善眼睛的焦距調節機能。
牛磺酸	0.5%	提供眼睛重要的營養，緩和眼睛疲勞。
L-天門冬氨酸鎂及 L-天門冬氨酸鉀 (等量混合)	0.5%	
鹽酸吡哆辛 (維生素 B ₆)	0.1%	
甘草酸鉀	0.05%	透過抗發炎作用，抑制眼睛發炎。
縮水蘋果酸氫芬尼拉明	0.02%	透過抗組織胺作用，抑制眼睛發癢。
硫酸軟骨素鈉	0.1%	防止角膜乾燥，保護眼睛。
尿囊素	0.1%	透過抗發炎作用，舒緩眼睛發炎。

添加物：等張化劑、硼酸、pH 調節劑、苯扎氯銨、氯丁醇、l-薄荷醇、冰片、dl-樟腦、聚山梨醇酯80、乙二胺四乙酸二鈉

[注意]

本藥劑點眼後，口中可能感到甜味，此為有效成分的甘草酸鉀所造成，無須擔憂。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- (6) 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早使用完畢。(這是為了確保品質)
- (7) 依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。



點眼藥水時的注意事項與正確的點眼方式

注意事項

- 瓶口接觸眼瞼、睫毛可能沾附眼屎或雜菌等而造成藥劑污染或藥水混濁，請特別注意。

正確點眼方式

- 請將雙手徹底洗淨，且手指請勿直接碰觸到眼睛。
- 請臉稍微朝上，用手指拉動下眼瞼，將藥液滴在眼瞼內側。



[提供多語言產品資訊時的免責聲明]

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商 (或我們) 的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商 (或我們) 對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。