

◆IRIS AG UNIT眼药水有效缓解眼睛的炎症、充血，具有温和的使用效果。■此药剂为不含防腐剂的1次性使用包装。

效能或效果

眼睛疲劳、结膜充血、眼病预防（游泳后、灰尘或汗液进入眼睛时等）、因紫外线等光线引发的眼炎（雪盲等）、眼睑炎（眼睑糜烂）、佩戴硬性隐形眼镜时的不适感、眼睛发痒、视线模糊（眼眵较多时等）

用法及用量

请按1天3~6次，1次2~3滴点眼。
请严格遵守规定的用法用量。
过量使用有可能会感觉异常眩光或反而导致充血
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
请勿戴着软性隐形眼镜使用。
仅限作为滴眼药水使用。
开封时请勿强行拉开。此外，开封时用力的话可能会使药液飞散，因此请注意。
本药剂为"1次性"滴眼液不含防腐剂，因此使用后的剩余液体请倒掉。

成分及分量

ε-Aminocaproic acid 1.00%
Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25%
Chlorpheniramine Maleate 0.03%
Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05%
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1.00%
Chondroitin Sulfate Sodium 0.10%

添加剂

Boric acid,pH adjusting agent,Isotonic agents,Edetate sodium

成分及分量相关注意

用本药剂滴眼后，有时口中会感觉到甜味，甜味是有效成分dipotassium glycyrrhizinate引起的，因此不用担心。

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
拥有以下症状的人群
眼睛剧烈疼痛
接受以下诊断的人群
青光眼
使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹、发红
发痒
眼睛：
充血
发痒
红肿
●下述情况时应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
未改善视线模糊时。
使用5~6天后症状仍无改善时。

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
请勿与其他人共用
请勿置于汽车的仪表板等高温下。（会发生容器变形或药液的质量劣化）
请注意如果将产品放进裤子的后口袋等，盖子有可能会打开。
请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任