

使用前请务必阅读本说明书。请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

## 视力模糊、眼睛疲劳

# IRIS 40

3类药品

(眼药)

- ◆ 在日常生活中，过度用眼会出现附近的物体看不清、文字模糊难读、眼睛易疲劳等症状。
- ◆ IRIS 40促进眼部的新陈代谢，使眼睛的功能接近正常状态，对视力模糊以及眼睛疲劳等症状有显著效果。



## 使用注意事项



### 咨询事项



#### 1 下述人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册销售商

- (1) 正在接受医生治疗者。
- (2) 曾因药物等发生过敏症状者。
- (3) 有下述症状者。  
剧烈的眼痛
- (4) 接受以下诊断者。  
青光眼

#### 2 使用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀

#### 3 出现下述情况时请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

- (1) 视力模糊未改善时。
- (2) 使用2周左右症状仍未缓解时。

## 功效

视力模糊（眼垢多等）、眼睛疲劳、眼睛发痒、结膜充血、紫外线及其他光线造成的眼炎（雪盲等）、眼病预防（游泳后，灰尘或汗水进入眼睛等时）、睑炎（眼睑发炎）、佩戴硬性隐形眼镜时的不适

### 适用于以下情形



驾驶车辆引起的眼睛疲劳



使用电脑等原因造成的视力模糊和眼睛疲劳



观看电视后造成的眼睛疲劳

## 用法用量

请按每天3~6次，每次2~3滴点眼。

### [注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 请不要让容器的尖端碰到眼皮、睫毛。并且，请勿使用浑浊的眼药水。
- (4) 请勿在佩戴软性隐形眼镜的状态下使用。
- (5) 请只用于点眼。

## 成分

成分	含量	作用
甲硫酸新斯的明	0.002%	改善下降的调焦功能。
$\alpha$ 生育酚醋酸酯 (天然维生素E)	0.03%	通过抗氧化作用及促进血液循环作用，改善血流，帮助营养供应。
黄素腺嘌呤 二核苷酸二钠 (活性维生素B <sub>2</sub> )	0.05%	促进新陈代谢，改善下降的眼睛功能。
牛磺酸	1.0%	为眼睛补充营养，促进新陈代谢，具有缓解眼睛疲劳的效果。
硫酸软骨素钠	0.1%	预防角膜干燥，保护眼睛。
马来酸氯苯那敏	0.02%	利用抗组胺作用缓解眼睛瘙痒。

辅料：L-薄荷醇、冰片、苯扎氯铵、三氯叔丁醇、依地酸钠、聚山梨酯80、聚氧乙烯化蓖麻油、等渗剂、硼酸、柠檬酸、柠檬酸钠

## 储存及操作注意事项

- (1) 请在避免阳光直射的阴凉场所密封保存。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。(否则会导致误用或变质)
- (4) 请勿与他人共用。
- (5) 请勿放置在车辆仪表盘等高温部位。(否则会导致容器变形或药液质量劣化)
- (6) 如果在点眼时药液溢出导致衣服等着色，请立即用水清洗。  
(本品中的黄色由维生素B<sub>2</sub>成分产生)
- (7) 请勿使用超过使用期限的产品。  
此外，即使在使用期限内，开封后也请尽早使用。  
(为保证质量)
- (8) 根据贮存状态不同，容器的尖端及盖子内侧可能会附有成分晶体。若出现这种情况，请用清洁的纱布等轻轻擦拭后再使用。



## 滴眼药水时的注意事项与正确用法

### 注意

- 请注意，如果容器尖端接触到眼皮或睫毛，药液可能会由于眼垢或杂菌等而受到污染或变浑浊。

### 正确用法

- 请认真洗手，注意手指不要直接接触眼睛。
- 请微微向上，用手指拨开下眼睑，将药液滴到眼睑内侧。



## 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。