

사용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

눈이 침침하거나 피로할 때에

IRIS 40

제3류 의약품
〈안약〉

- ◆ 일상에서 우리의 눈을 혹사하다 보면 가까이 있는 것이 잘 보이지 않거나 눈이 침침해서 글씨를 잘 읽을 수 없고 눈이 쉽게 피로해지는 등의 증상이 나타납니다.
- ◆ IRIS 40은 눈의 신진대사를 활발하게 하고 눈 기능을 정상 상태에 가까워지게 하여 눈이 침침하거나 피로한 증상에 효과가 우수합니다.



사용 시 주의사항



상담



1 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

- (1) 의사에게 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약물 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람.
극심한 눈 통증
- (4) 다음 진단을 받은 사람.
녹내장

2 사용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

| 관련 부위 | 증상 |
|-------|-------------|
| 피부 | 발진·발적, 가려움 |
| 눈 | 충혈, 가려움, 부기 |

3 다음과 같은 경우 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

- (1) 눈이 침침한 것이 개선되지 않는 경우.
- (2) 2주 정도 사용해도 증상이 나아지지 않는 경우.

효능

눈 침침(눈곱이 많이 낄 때), 눈의 피로, 눈 가려움증, 결막 충혈, 자외선 또는 기타 광선으로 인한 안염(설맹 등), 눈병 예방(수영 후, 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때 등), 안검염(눈꺼풀 짓무름), 하드 콘택트 렌즈 착용 시 불편감

이러한 경우에



차량 운전으로
눈이 피로할 때에



컴퓨터 사용 시 눈이
침침하거나 피로한
경우에



TV 시청 후 눈이
피로할 때에

용법·용량

하루에 3~6회, 1회 2~3방울을 점안하십시오.

[주의]

- (1) 지정된 용법 및 용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 어린이가 사용할 경우 보호자의 지도 감독 하에 사용해야 합니다.
- (3) 용기 입구가 눈꺼풀이나 눈썹에 닿지 않게 하십시오. 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- (4) 소프트 콘택트 렌즈를 착용한 상태로 사용하지 마십시오.
- (5) 점안용으로만 사용하십시오.

성분

| 성분 | 분량 | 효능 |
|--|--------|--|
| 네오스티그민 메틸 황산염 | 0.002% | 저하된 초점 조절 기능을 개선합니다. |
| 아세트산d- α -토코페롤 (천연 비타민 E) | 0.03% | 항산화 작용, 혈액 순환 촉진 작용은 혈류를 개선하고 영양 공급을 돕습니다. |
| 플라비아데닌 디뉴클레오티드나트륨 (활성 비타민 B ₂) | 0.05% | 신진대사를 촉진하여 저하된 눈의 기능을 개선합니다. |
| 타우린 | 1.0% | 눈에 영양분을 공급하고 신진대사를 촉진하여 눈이 피로할 때 효과적입니다. |
| 콘드로이틴 황산에스테르나트륨 | 0.1% | 각막의 건조를 방지하고 눈을 보호합니다. |
| 클로르페니라민말레산염 | 0.02% | 항히스타민 작용은 눈의 가려움을 줄여줍니다. |

첨가물: l-멘톨, 용뇌, 염화벤잘코늄, 클로로부탄올, 에데트산 Na, 폴리소르베이트 80, 폴리옥시에틸렌 경화피마자유, 등장화제, 붕산, 구연산, 구연산 Na

보관 및 취급 시 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 뚜껑을 완전히 닫아 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
- (5) 차량의 대시보드와 같이 온도가 높은 곳에 방치하지 마십시오. (용기가 변형되거나 약액 품질이 저하될 수 있습니다)
- (6) 점안 중에 약액이 흘러 의복 등에 착색되면 즉시 물로 씻어내십시오.
(본 약제가 노란색인 것은 성분 중 비타민 B₂가 함유되어 있기 때문입니다)
- (7) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
또 개봉 후에는 사용기한이 남아 있어도 가능한 빨리 사용하십시오. (품질 유지를 위해)
- (8) 보존 상태에 따라 성분의 결정이 용기 입구 또는 뚜껑 안쪽에 묻을 수 있습니다. 이 때는 깨끗한 거즈로 가볍게 닦아낸 후 사용하십시오.



안약 점안 시 주의사항과 올바른 점안 방법

주의

- 용기 입구가 눈꺼풀이나 눈썹에 닿으면 눈곱이나 잡균 등으로 인해 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있으므로 주의하십시오.

올바른 점안 방법

- 손을 잘 씻고 눈에 직접 손가락이 닿지 않도록 하십시오.
- 살짝 고개를 들고 손가락으로 아래 눈꺼풀을 내린 후 눈꺼풀 안쪽에 방울을 떨어뜨립니다.



[다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.