

使用前請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以備不時之需。

緩解視力模糊、眼睛疲勞

IRIS 40

第三類醫藥品

(眼藥水)

- ◆ 日常用眼過度可能造成近距離難以看清、文字模糊難以閱讀、眼睛易於疲勞等症狀出現。
- ◆ IRIS 40 可促進眼睛新陳代謝，幫助眼睛機能恢復正常狀態，有效緩解視力模糊、眼睛疲勞等症狀。



使用上的注意事項



諮詢事項



1 下列人士使用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (3) 有下列症狀的人。
劇烈的眼睛痛
- (4) 受診斷為患有下列疾病者。
青光眼

2 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

3 若有以下狀況請停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 視力模糊沒有改善的情況下。
- (2) 即使使用 2 週左右，症狀也沒有改善的情況下。

療效

視力模糊（眼屎多時等）、眼睛疲勞、眼睛癢、結膜充血、因紫外線等光線所造成的眼炎（雪眼炎等）、預防眼病（游泳之後，灰塵和汗水跑進眼睛時等）、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、配戴硬式隱形眼鏡時的不適感

在這些時候



緩解開車所導致的
眼睛疲勞



緩解使用電腦時等
所導致的視力模糊、
眼睛疲勞



緩解看完電視後的
眼睛疲勞

用法及用量

1 天 3 ~ 6 次 · 1 次點眼 2 ~ 3 滴。

[注意]

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。
- (5) 僅供點眼使用。

成分

成分	分量	效用
硫酸甲酯新斯狄明	0.002%	改善弱化的眼睛對焦調節功能。
d-α-生育酚醋酸酯 (天然維生素 E)	0.03%	透過抗氧化作用、促進血液循環作用改善血液流通，幫助營養供給。
黃素腺嘌呤 二核苷酸鈉 (活性型維生素 B ₂)	0.05%	促進新陳代謝，改善弱化的眼睛機能。
牛磺酸	1.0%	提供眼睛營養，促進新陳代謝，有效緩解眼睛疲勞。
硫酸軟骨素鈉	0.1%	防止角膜乾燥，保護眼睛。
縮水蘋果酸氫芬尼拉明	0.02%	透過抗組織胺作用，抑制眼睛發癢。

添加物：l-薄荷醇、冰片、苯扎氯銨、氯丁醇、乙二胺四乙酸二鈉、聚山梨醇酯 80、聚氧乙烯氯化蓖麻油、等張化劑、硼酸、檸檬酸、檸檬酸鈉

保管及使用上的注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- (6) 點眼之際藥水不慎滴落而造成衣物等染色時，請立即以水清洗。
(本藥劑所含黃色成分為維生素 B₂)
- (7) 請勿使用超過使用期限的產品。
此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早使用完畢。
(這是為了確保品質)
- (8) 依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。



點眼藥水時的注意事項與正確的點眼方式

注意

- 瓶口接觸眼瞼、睫毛可能沾附眼屎或雜菌等而造成藥劑污染或藥水混濁，請特別注意。

正確點眼方式

- 請將雙手徹底洗淨，且手指請勿直接碰觸到眼睛。
- 請臉稍微朝上，用手指拉動下眼瞼，將藥液滴在眼瞼內側。



【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。