

◆IRIS GUARD P是含有抗炎症成分pranoprofen的眼药水。■Pranoprofen通过抑制炎症的致病物质（前列腺素）的产生，缓解眼睛的异物感（有东西在里面、被扎的感觉）、泪眼、充血、发痒等症状。■此药剂为温和清爽型眼药水。

效能或效果

缓解眼睛的下述症状：异物感（有东西在里面、被扎的感觉）、泪眼、结膜充血、眼睛发痒、眼眵较多时的视线模糊

用法及用量

请按1天4次，1次1~2滴点眼。
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
请勿戴着隐形眼镜使用。（先拿下隐形眼镜再滴眼）
仅限作为滴眼药水使用。

成分及分量

Pranoprofen 0.05%

添加剂

Boric acid,pH adjusting agent,Edetate sodium,BHT,Benzalkonium chloride,l-Menthol,dl-Camphor,Polysorbate 80

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群不要使用
- 未满7岁的儿童
- 孕妇或有其可能性的人群
- 哺乳期人群

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 正在接受医师治疗的人群
- 因药物等出现过过敏症状的人群
- 拥有以下症状的人群
- 眼睛剧烈疼痛
- 接受下述诊断的人群。
- 青光眼
- 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者
- 皮肤：
 - 起疹、发红
 - 发痒
- 眼睛：
 - 充血
 - 发痒
 - 红肿
 - 刺激感
 - 异物感、泪眼、眼眵较
- 其他：
 - 呼吸困难
- 下述情况时应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 使用本药剂后症状恶化时，
- 未改善视线模糊时。
- 也有可能是青光眼等
- 若使用3天左右后症状仍未改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 虽然症状改善，但服用时间超过2周的情况

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。
尤其请勿置于汽车内部或取暖器附近等有可能高温的场所。且，为了防止光线引起质量变化，请密封本药剂并务必放进附带的随身用袋（带有遮光性）中。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿与其他人共用

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

根据保存状态，成分的结晶可能会附着在容器的前端或盖子内侧。此时，请用干净的纱布等轻轻擦拭后使用。

41

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任