

アイリスガードP

◆アイリスガードPは抗炎症成分のブラプロフェンを配合した目薬です。■ブラプロフェンは炎症の原因物質（プロスタグランジン）の生成をおさえることにより、目の異物感（コロコロ・チクチクする感じ）・なみだ目・充血・かゆみ等の症状を緩和します。■やさしい清涼感の目薬です。

効能・効果

目の次の症状の緩和：異物感（コロコロ・チクチクする感じ）、なみだ目、結膜充血、目のかゆみ、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1～2滴、1日4回点眼してください。
定められた用法・用量を厳守してください。
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。
コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。（一旦レンズをはずしてから点眼してください）
点眼用에만使用してください。

成分及び分量

ブラプロフェン 0.05%

添加物

ホウ酸,pH調節剤,エデト酸Na,BHT,ベンザルコニウム塩化物,l-メントール,dl-カンフル,ポリソルベート80

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

●次の人は使用しないこと

7才未満の小児

妊婦又は妊娠していると思われる人。

授乳中の人。

相談すること

●次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の症状のある人。

はげしい目の痛み

次の診断を受けた人。

緑内障

使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

目：

充血

かゆみ

はれ

刺激感

異物感、なみだ目、目やに

その他：

息苦しさ

●次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

症状が悪化した場合

目のかすみが改善されない場合。

緑内障等の可能性も考えられる

●3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

症状の改善がみられても服用期間が2週間を超える場合

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しい所に（密栓して）保管すること。

特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないでください。なお、本剤は光による品質の変化を防ぐため、密栓して、必ず添付の携帯用袋（しゃ光性がある）に入れてください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

他の人と共用しないでください

使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)

保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。

41

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。