

◆愛力舒Guard P點眼液為含有抗發炎成分的pranoprofen配方眼藥水。■Pranoprofen抑制引發炎症物質（前列腺素）生成而緩和眼睛異物感（異物在眼球內滾動的感覺、刺眼感覺）、淚眼、充血、眼睛發癢等症狀。■溫和清涼感的眼藥水。

療效或效果

舒緩下列眼部症狀：異物感（異物在眼球內滾動的感覺、刺眼感覺）、淚眼、結膜充血、眼睛發癢、眼屎較多時的視力模糊

用法及用量

請1次1～2滴，1天4次滴眼。

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。

請勿於配戴隱形眼鏡的狀態下使用。（請先將隱形眼鏡摘下後再行點眼）

僅供點眼使用。

成分及分量

Pranoprofen 0.05%

添加劑

Boric acid,pH adjusting agent,Edetate sodium,BHT,Benzalkonium chloride,l-Menthol,dl-Camphor,Polysorbate 80

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●下列的人請勿使用

未滿7歲的兒童

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

劇烈的眼睛痛

受診斷為患有下列疾病者。

青光眼

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

眼睛：

充血

發癢

腫脹

刺激感

異物感、淚眼、眼屎

其他：

呼吸困難

●下列情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

因使用本藥劑而使症狀惡化時，

視力模糊沒有改善的情況下。

具有罹患青光眼等的可能性

●即使使用3天左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

即使症狀改善，但服用期間超過2週時

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。

請勿置於車內或暖氣設備周邊等高溫或可能產生高溫之處。此外，為避免光線造成藥液變質，請務必蓋緊瓶蓋後收入所附攜帶用外袋（具遮光性）保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿與他人共用

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）
依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。

41

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。