

◆愛力舒點眼液(溫和型)為有效緩解日常生活用眼過度所導致的眼睛疲勞、視力模糊的眼藥水。■「Neostigmine methylsulfate」改善眼睛對焦調節功能，緩和眼睛疲勞。■點眼後溫和涼爽。

療效或效果

眼睛疲勞、預防眼病（游泳之後，灰塵和汗水跑進眼睛時等）、配戴硬式隱形眼鏡時的不適感、視力模糊（眼屎多時等）

用法及用量

請1天3～6次，1次2～3滴 滴眼。

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。

請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。

僅供點眼使用。

成分及分量

Neostigmine methylsulfate 0.005%

d-α-Tocopherol acetate (Natural vitamin E) 0.05%

Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6)(Vitamin B6) 0.1%

Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1%

Potassium L-aspartate 1%

添加劑

l-Menthol, Dryobalanops aromatica resin, Chlorobutanol, Benzalkonium chloride, citric acid, Sodium citrate, Boric acid, pH adjusting agent, Edetate sodium, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, Polysorbate 80, Anhydrous ethanol

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

劇烈的眼睛痛

接受過下列診斷的人。

青光眼

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

眼睛：

充血

發癢

腫脹

●下列情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

視力模糊沒有改善的情況下。

即使使用2週左右，症狀也沒有改善的情況下。

保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿與他人共用

請勿置於汽車儀表板等高溫場所。（可能造成容器變形或藥液品質惡化）

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。