

◆IRIS AG GUARD通过3种有效成分的作用抑制引起过敏症状的致病物质（组织胺等）的发生，缓解充血等炎症，并调节因炎症受损的眼部状态。■此药剂具有凉爽的清爽型使用效果。

效能或效果

缓解由花粉、室内尘埃等引起的以下眼睛的过敏症状：眼睛充血、眼睛发痒、视线模糊（眼眨较多时等）、泪眼、异物感（有东西在里面的感觉）

用法及用量

请按1天4次（早晨，中午，傍晚以及入睡前），1次1~2滴点眼。

请严格遵守规定的用法用量。

儿童使用时应在监护人指导监督下使用。

眼睛周围流出液体，请马上擦拭。

请注意如果容器前端接触眼睑或睫毛的话，会因为眼眵或杂菌等发生药液污染或混浊。

液体浑浊时请勿使用。

请勿作为隐形眼镜的润眼液，或戴着隐形眼镜使用。

仅限作为滴眼药水使用。

用于因花粉等季节性过敏引起的眼睛症状时，进入花粉飞散期开始出现症状后，在症状较轻的早期阶段开始使用会比较有效。

成分及分量

100mL中

Ketotifen Fumarate 69mg (50mg as Ketotifen)

Dipotassium Glycyrrhizinate 250mg

Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1000mg

添加剂

l-Menthol,dl-Camphor,Chlorobutanol ,D-Mannitol ,Boric acid,Tromethamine ,Edetate sodium,Benzalkonium chloride

成分及分量相关注意

用本药剂滴眼后，有时口中会感觉到甜味，甜味是有效成分dipotassium glycyrrhizinate引起的，因此不用担心。

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

●下述人群不要使用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

未满1岁的婴幼儿。

与滴鼻液并用时，在使用之后，请不要进行交通工具或机械类的驾驶操作

（会出现嗜睡症状）

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

减敏疗法等，正在接受过敏治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

眼睛剧烈疼痛

分不清是因过敏引起的症状或其他原因引起的症状的人群。

尤其如果是下述情况，很难判断是因为过敏引起的，因此在使用前请咨询医生

仅单只眼睛出现症状的情况

只有眼睛的症状，鼻子没有出现症状的情况

对于视力也有影响的情况

眼眨较多的情况

孕妇或有可能性的人群

接受下述诊断的人群。

青光眼

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

眼睛：

充血

刺激感

疼痛
红肿
发痒
视线模糊
眼睛干燥
嗜睡
眼睛畏光
头痛

其他：口腔干燥

※包括眼睛周围。

※※根据不同人群，有可能在开始使用初期（第1～2天）在眼睑、眼睛周围、脸颊等部位出现严重的发痒、肿胀、痛感等症状。

●下述情况时应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

未改善视线模糊时。

即使使用1周左右仍不见症状好转的情况

●下述情况，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

即使症状改善，但是使用时间超过2周的情况。

保管及使用注意事项

避免阳光直射、且盖好盖子，尽量保管在阴凉的场所

请保管在儿童无法触及的地方。

避免误用，并保证质量，请不要移至其他容器中

为了防止污染，

请勿与其他人共用

请勿置于汽车的仪表盘等高温下。（会发生容器变形或药液的质量劣化）

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

12

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任