

◆愛力舒AG Guard點眼液三種有效成分作用，抑制引起過敏症狀的原因物質（組織胺等）生成，緩解充血等發炎症狀，改善因發炎而受損的眼睛狀態。■賦予帶清涼感的勁涼感受。

## 療效或效果

緩和由花粉、室內塵埃（室內灰塵）等引起的下列眼部過敏症狀：眼睛充血、眼睛發癢、視力模糊（眼屎較多時等）、淚眼、異物感（異物在眼球內滾動的感覺）

## 用法及用量

請1次1～2滴，1天4次（早、午、傍晚及睡前）滴眼。

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

如有藥液流至眼周請立即拭除。

瓶口接觸眼瞼、睫毛可能沾附眼屎或雜菌等而造成藥劑污染或藥水混濁，請特別注意。

請勿使用混濁者。

請勿作隱形眼鏡潤滑液使用或於配戴隱形眼鏡的狀態下使用。

僅供點眼使用。

為舒緩因花粉等季節性過敏所引發的眼部症狀時，請於進入花粉飛散期，症狀甫出現而較為輕微時使用，效果更佳。

## 成分及分量

100mL中

Ketotifen Fumarate 69mg (50mg as Ketotifen)

Dipotassium Glycyrrhizinate 250mg

Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1000mg

## 添加劑

l-Menthol,dl-Camphor,Chlorobutanol ,D-Mannitol ,Boric acid,Tromethamine ,Edetate sodium,Benzalkonium chloride

### 成分及分量相關的注意事項

本藥劑點眼後，口中可能感到甜味，此為有效成分的 dipotassium glycyrrhizinate所造成，無須擔憂。

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

●下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

未滿1歲的嬰兒。

搭配鼻用噴液劑使用時，使用後請勿駕駛交通工具或操作機械

（可能出現嗜睡等。）

### 諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

正在接受減敏療法等過敏治療者

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

劇烈的眼睛痛

不清楚是否因過敏或其他原因引起症狀者。

特別是下列情況，由於不能斷定是否因過敏引起，因此使用前請諮詢醫師

僅單眼出現症狀時

僅眼部出現症狀，鼻部並無症狀時

視力亦受影響時

眼屎過多時

孕婦或可能懷孕的人。

受診斷為患有下列疾病者。

青光眼

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

眼睛：

充血

刺激感

疼痛  
腫脹  
發癢  
視力模糊  
眼睛乾燥骨頭  
嗜睡  
眼睛畏光  
頭痛  
其他：口乾

※含眼周。

※※部分患者可能於使用初期（第1～2天）於眼皮、眼周、臉頰等處出現嚴重搔癢、腫脹、疼痛等症狀。

●下列情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

視力模糊沒有改善的情況下。

使用1週左右症狀仍未見改善時

●下列情況下，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

即使症狀改善，但使用期間超過2週時。

## 保管及使用上的注意事項

請旋緊瓶蓋，避免日光直射，盡量置於陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

為避免誤用並確保品質，請勿換裝於其他容器

為避免污染，

請勿與他人共用

請勿置於汽車儀表板等高溫場所。（可能造成容器變形或藥液品質惡化）

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

12

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。