

# IRIS FON BREAK

- ◆現代人使用手機所引起的眼睛疲勞是因長時間對焦看近物而使得睫狀肌持續緊繃，加上不斷近距離暴露於光線下，緊盯螢幕的眼睛視線上下左右不斷細微移動所引起。
- ◆愛力舒 IRIS FON BREAK 緩解長時間用眼受到光線傷害所導致的眼睛疲勞、發炎。
- ◆焦距調節機能改善成分之外並添加基準內最大濃度配方<sup>\*1</sup>的眼睛營養成分及促進角膜組織代謝成分。最強滲透<sup>\*2</sup>清涼爽快。
- ◆日本國內最多<sup>\*3</sup>，12 種類有效成分配方。
  - ※1 一般眼科用藥製造販售許可基準內最大濃度配方
  - ※2 愛力舒系列中
  - ※3 一般眼科用藥製造販售許可基準內最多有效成分數配方

## 療效

因紫外線等光線所造成的眼炎（雪眼炎等）、眼睛疲勞、結膜充血、眼睛癢、預防眼病（游泳之後，灰塵和汗水跑進眼睛時等）眼瞼炎（眼瞼潰爛）、視力模糊（眼屎多時等）、配戴硬式隱形眼鏡時的不適感

## 用法及用量

請 1 天 5~6 次，1 次 2~3 滴 滴眼。

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 過度使用，可能感到異常目眩或者反而導致眼睛充血。
- 使用於兒童的情況下，請在家長的指導監督下使用。
- 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- 請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。
- 僅供點眼使用。

## 成分

硫酸甲酯新斯狄明 0.005%  
牛磺酸 1%  
L-天門冬氨酸鉀 0.9%  
鹽酸吡哆辛（維生素 B<sub>6</sub>） 0.05%  
泛醇 0.05%  
黃素腺嘌呤二核苷酸鈉（活性型維生素 B<sub>2</sub>） 0.05%  
ε-氨基己酸 1%  
鹽酸黃連素 0.015%  
甘草酸鉀 0.1%  
鹽酸四氫唑啉 0.01%  
縮水蘋果酸氯芬尼拉明 0.03%  
硫酸軟骨素鈉 0.05%

### 添加劑

聚山梨醇酯 80，桉樹油，l-薄荷腦，乙二胺四乙酸二鈉，硼酸，苯扎氯銨，pH 調節劑

### 注意事項

本藥劑點眼後，口中可能感到甜味，此為有效成分的甘草酸鉀所造成，無須擔憂。

## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者正在接受醫師治療的人。
  - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
  - 有下列症狀的人。
    - 劇烈的眼睛痛
  - 接受過下列診斷的人。
    - 青光眼
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者皮膚：發疹、發紅，發癢

眼睛：充血，發癢，腫脹

- 若符合以下狀況，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者視力模糊沒有改善的情況下。  
即使使用 5~6 天，症狀也沒有改善的情況下。

### 保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿與他人共用。
- 請勿置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- 點眼之際藥水不慎滴落而造成衣物等染色時，請立即以水清洗。(本藥劑所含黃色成分為鹽酸黃連素水合物及維生素 B<sub>2</sub>)
- 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。(為確保品質)
- 依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。

11

#### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。