

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目の疲れ、コンタクトレンズ装着時の不快感に

# アイリスCL-Iプレミアム うるおいケア

第3類医薬品

〈目薬〉

- ◆涙液に近い性質を持った人工涙液で、涙液不足に伴う乾いた目(ドライアイ)をうるおします。
- ◆涙に含まれるミネラル成分(塩化カリウム、塩化ナトリウム)、涙の蒸散を防ぎ、目のうるおいを保持する成分(ヒプロメロース)、乾燥によりダメージを受けた角膜表面を保護する成分(コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)、目の新陳代謝を促進する成分(L-アスパラギン酸カリウム、タウリン)が、目の乾き、目の疲れを改善します。
- ◆すべてのコンタクトレンズ(使い捨て・ソフト・O<sub>2</sub>・ハード)を装着したまま点眼できます。コンタクトレンズを装着していない目にも点眼いただけます。
- ◆1回使いぎり清潔パック(個包装)で、開けるたびフレッシュ。
- ◆防腐剤フリー(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)、清凉化剤フリー(メントール)で、とろみのあるやさしいさし心地の目薬です。



## 使用上の注意



### 相談すること



- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください**
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
  - (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障
- 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください**
  - (1) 目のかすみ改善されない場合。
  - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

## 効能

ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

### 【使い方】

①無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。

②1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。(1本で両眼に点眼できます)

③容器には、薬液が押し出しやすいように、やや多く入っていますが、一度開封したものは、液が残っていても必ず捨ててください。

プラスチックとして分別してください。



### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)点眼用のみ使用してください。
- (5)無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- (6)本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。



容器の先で目を傷つけないように注意してください。


## 成分

成分	分量	はたらき
ヒプロメロース	0.25%	涙の蒸散を防ぎ、目のうるおいを保持します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	涙を保持する作用により角膜表面を保護します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.5%	目の新陳代謝を促進します。
タウリン	0.5%	
塩化カリウム	0.103%	涙の成分であり、ミネラルを補給します。
塩化ナトリウム	0.51%	

添加物：炭酸水素Na、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元

ファーマパック株式会社

富山県富山市小中163番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

## 用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

### 【使い方】

①無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。



②1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。(1本で両眼に点眼できます)



③容器には、薬液が押し出しやすいように、やや多く入っていますが、一度開封したものは、液が残っていても必ず捨ててください。



プラスチックとして分別してください。

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)点眼用のみ使用してください。
- (5)無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- (6)本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。



容器の先で目を傷つけないように注意してください。


## 成分

成分	分量	はたらき
ヒプロメロース	0.25%	涙の蒸散を防ぎ、目のうるおいを保持します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	涙を保持する作用により角膜表面を保護します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.5%	目の新陳代謝を促進します。
タウリン	0.5%	
塩化カリウム	0.103%	涙の成分であり、ミネラルを補給します。
塩化ナトリウム	0.51%	

添加物：炭酸水素Na、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元

ファーマパック株式会社

富山県富山市小中163番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

## 用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

### 【使い方】

①無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。



②1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。(1本で両眼に点眼できます)



③容器には、薬液が押し出しやすいように、やや多く入っていますが、一度開封したものは、液が残っていても必ず捨ててください。



プラスチックとして分別してください。

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)点眼用のみ使用してください。
- (5)無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- (6)本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。



容器の先で目を傷つけないように注意してください。


## 成分

成分	分量	はたらき
ヒプロメロース	0.25%	涙の蒸散を防ぎ、目のうるおいを保持します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	涙を保持する作用により角膜表面を保護します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.5%	目の新陳代謝を促進します。
タウリン	0.5%	
塩化カリウム	0.103%	涙の成分であり、ミネラルを補給します。
塩化ナトリウム	0.51%	

添加物：炭酸水素Na、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元

ファーマパック株式会社

富山県富山市小中163番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)