

用於眼睛疲勞、戴隱形眼鏡時的不適感

IRIS CL-I PREMIUM MOISTURIZING CARE

第三類醫藥品

〈眼藥水〉

- ◆ 具有與淚液相近性質的人工淚液，可滋潤因淚液不足導致的眼睛乾澀（乾眼症）。
- ◆ 淚液中含有的礦物質成分（氯化鉀、氯化鈉）、防止淚液蒸發、保持眼睛濕潤的成分（羥丙甲纖維素）、保護因乾燥而受損之角膜表面的成分（硫酸軟骨素鈉）、促進眼睛新陳代謝的成分（L-天門冬氨酸鉀、牛磺酸），可改善眼睛乾澀、眼睛疲勞。
- ◆ 可在戴任何隱形眼鏡（拋棄式、軟式、高透氧、硬式）時點眼。也可點在沒戴隱形眼鏡的眼睛。
- ◆ 單次用完的乾淨包裝（個別包裝），每次打開都是新鮮狀態。
- ◆ 不含防腐劑（苯扎氯銨、對羥基苯甲酸酯）、不含清涼劑（薄荷腦），略帶稠度點眼感覺溫和的眼藥水。



使用上的注意事項



諮詢事項



- 1 下列人士使用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1)正在接受醫師治療者。
- (2)曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (3)有下列症狀的人。
劇烈的眼睛痛
- (4)受診斷為患有下列疾病者。
青光眼

- 2 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

- 3 若有以下狀況請停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1)視力模糊沒有改善的情況下。
- (2)即使使用2週左右，症狀也沒有改善的情況下。

療效

配戴硬式隱形眼鏡或軟式隱形眼鏡時的不適感、輔助淚液（眼睛乾澀）、眼睛疲勞、視力模糊（眼屎多時等）

用法及用量

1 天 3~6 次，1 次點眼 2~3 滴。

【使用方法】

① 勿用力拉扯，請慢慢旋轉蓋子部分開封。



② 1 天 3~6 次，1 次點眼 2~3 滴。(1 瓶可點兩眼)



③ 為了讓藥液更容易擠出，容器中裝入了稍多藥液，但只要一經開封，即便有藥液殘留也請務必丟棄。

請分類為塑膠垃圾。



【注意】

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- (4) 僅供點眼使用。
- (5) 請勿用力拉扯開封。此外，開封時用力過度可能造成藥液噴濺，敬請留意。
- (6) 本藥劑為「單次使用」的點眼劑，不含防腐劑，未用盡的殘餘藥液請廢棄。



請注意避免容器前端弄傷眼睛。

成分

成分	分量	效用
羥丙甲纖維素	0.25%	可防止淚液蒸發，保持眼睛的濕潤。
硫酸軟骨素鈉	0.5%	透過維持淚液的作用保護角膜表面。
L-天門冬氨酸鉀	0.5%	促進眼睛的新陳代謝。
牛磺酸	0.5%	
氯化鉀	0.103%	可補充淚液成分中的礦物質。
氯化鈉	0.51%	

添加劑：碳酸氫鈉、pH 調節劑

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陰涼處，避免日光直射。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- (6) 收於褲子後側口袋等處可能造成瓶口開啟，敬請留意。
- (7) 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早使用完畢。(這是為了確保品質)



【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。