

\* 2024年8月修订  
(使用注意事项(修订))

使用前请务必阅读本说明书。  
请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

麦粒肿、结膜炎 **2类药品** (眼药水)

# NEW SULFAGLYCYR IRIS

• NEW SULFAGLYCYR IRIS是一种眼药水，含有对麦粒肿以及结膜炎的致病菌有显著抗菌效果的长效抗菌药磺胺甲噁唑钠和缓解眼睛炎症及发痒的成分。



## 使用注意事项

务必阅读!



### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易发生不良反应)

- 1 下述人群请勿使用  
因本品或本品的成分发生过敏症状者。\*
- 2 请勿长期连续使用



### 咨询事项

- 1 下述人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册销售商  
(1) 正在接受医生治疗者。  
(2) 曾因药物等发生过敏症状者。  
(3) 有下述症状者。  
剧烈的眼痛
- 2 使用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商



相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀

\*可能会偶尔出现下述严重症状。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音嘶哑、喷嚏、喉咙发痒、憋闷、心悸、意识混沌等。

- 3 如果使用3~4天症状仍未改善，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

## 功效

麦粒肿、结膜炎(红眼)、睑炎(眼睑发炎)、眼睛发痒

适用于以下眼部症状

麦粒肿



睫毛根部及其附近细菌感染，引起炎症。眼睑红肿，伴有发痒。

结膜炎  
(红眼)



在游泳池等场所发生感染的案例较多，结膜(眼白、眼睑内侧)会充血，并伴有发痒。

睑炎  
(眼睑发炎)



由于细菌感染等会出现眼睑边缘肿胀、发炎和发痒等症状。

## 用法用量

请按每天3~6次，每次2~3滴点眼。

### [注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 请不要让容器的尖端碰到眼皮、睫毛。并且，请勿使用浑浊的眼药水。
- (4) 请勿在佩戴软性隐形眼镜的状态下使用。
- (5) 请只用于滴眼。

## 成分

成分	含量	作用
磺胺甲噁唑钠	4.0%	对麦粒肿及结膜炎的致病菌有显著的抗菌作用。
甘草酸二钾	0.25%	缓解因细菌感染等原因引起的眼睛炎症。
马来酸氯苯那敏	0.03%	利用抗组胺作用抑制眼睛发痒。
牛磺酸	0.1%	促进因细菌感染而受伤眼睛的组织修复。

辅料：硼砂、pH调节剂、苯扎氯铵、依地酸钠、聚山梨酯80

### [注意事项]

本品滴眼后，口中可能会感觉有苦味或甜味，苦味是活性成分磺胺甲噁唑钠引起，甜味是活性成分甘草酸二钾引起，无需担心。

## 储存及操作注意事项

- (1) 请盖严存放在避免阳光直射的阴凉场所。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。（否则会导致误用或变质）
- (4) 请勿与他人共用。
- (5) 请勿放置在车辆仪表盘等高温部位。（否则会导致容器变形或药液质量劣化）
- (6) 请勿使用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后也请尽早使用。（为保证质量）
- (7) 根据贮存状态不同，容器的尖端及盖子内侧可能会附有成分晶体。若出现这种情况，请用清洁的纱布等轻轻擦拭后再使用。



## 关于麦粒肿的注意事项

请小心不要揉眼睑或对眼睛进行其他刺激。（此外，虽然某些体质容易发生麦粒肿，但因疲劳过度或睡眠不足等原因导致体力下降时更易引发麦粒肿，因此注意保证充足睡眠，避免疲劳过度。）

## 滴眼药水时的注意事项与正确滴眼药水的方法

### 注意

- 请注意，如果容器的尖端接触到眼皮或睫毛，药液可能会由于眼垢或杂菌等而受到污染或变得浑浊。

### 正确用法

- 请认真洗手，注意手指不要直接接触眼睛。
- 请微微向上，用手指拨开下眼皮，将药液滴到眼睑内侧。



### [关于多语言产品信息时的免责声明]

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。