

# NEW SULFA GLYCYR IRIS

제2류 의약품  
안약

◆신 살파그리칠 아이리스는 다래끼와 결막염의 원인인 세균에 대하여 뛰어난 항균력을 나타내는 지속성 항균제 Sodium sulfamethoxazole에 눈의 염증 및 가려움을 진정시키는 성분을 배합한 안약입니다.

## 효능 또는 효과

결막염(유행성 결막염), 다래끼, 안검염(눈꺼풀 진무름), 눈의 가려움

## 용법 및 용량

1일 3~6회, 1회 2~3방울을 넣으십시오.

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것.

용기 끝부분을 눈꺼풀, 속눈썹에 닿지 않게 하십시오. 또한 혼탁한 것은 사용하지 마십시오.

소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.

점안용으로만 사용하십시오.

## 성분 및 분량

Sodium Sulfamethoxazole 4.00%

Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25%

Chlorpheniramine Maleate 0.03%

Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 0.10%

## 첨가물

Sodium borate, pH adjusting agent, Benzalkonium chloride, Edetate sodium, Polysorbate 80

## 성분 및 분량에 관한 주의

본제의 점안 후, 입 안에 쓴맛 또는 단맛을 느끼는 경우가 있으나, 쓴맛은 유효성분인 Sulfamethoxazole에 의한 것이고, 단맛은 유효성분인 Dipotassium glycyrrhizinate에 의한 것이므로 걱정하실 필요 없습니다.

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

●장기간 연용하지 않을 것

### 상담할 내용

●다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사의 치료를 받고 있는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

다음의 증상이 있는 사람.

심한 눈의 통증

사용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상담하십시오.□

피부:

발진·발적

가려움

눈:

충혈

가려움

부음

●3~4일 동안 사용해도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.

자동차 대시보드 등 고온하에 방치하지 마십시오.(용기의 변형 및 약액 품질이 열화될 수 있습니다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질 유지를 위하여)

보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 입구나 뚜껑 안쪽에 부착될 수 있습니다. 그럴 경우는 청결한 거즈 등으로 가볍게 닦아낸 후 사용하십시오.

**【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】**

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..