

\* 2024년 8월 개정  
(사용 시 주의사항 개정)

사용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.  
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

다래끼·결막염에 **제2류 의약품(일반의약품)** <안약>

# NEW SULFAGLYCYL IRIS

◆ NEW SULFAGLYCYL IRIS 는 다래끼와 결막염을 유발하는 세균에 대해 항균력이 뛰어난 지속성 항균제 설파메톡사졸 나트륨에 눈의 염증 및 가려움증을 진정시키는 성분을 배합한 안약입니다.



## 사용 시 주의사항



### ⊗ 금지 사항

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용이 생길 수 있습니다.)

#### 1 다음과 같은 사람은 사용하지 마십시오

본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람. \*

#### 2 장기간 연속해서 사용하지 마십시오



### 상담

#### 1 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

- (1) 의사에게 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람.  
극심한 눈 통증



#### 2 사용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부기

\* 드물게 다음과 같은 위중한 증상이 나타날 수 있습니다. 이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	사용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 심, 재채기, 목구멍 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 증상이 발현한다.

#### 3 3~4일간 사용해도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

## 효능

다래끼, 결막염(유행성 결막염), 안검염(눈꺼풀 짓무름), 눈 가려움

이러한 눈의 증상에는

다래끼	결막염 (유행성 결막염)	안검염 (눈꺼풀 짓무름)
눈썹 뿌리 부분과 그 부근에 세균이 감염되어 염증을 일으킨 것. 눈꺼풀이 붉게 붓고 가려움을 동반합니다.	수영장에서 감염되는 사례가 많으며 결막(흰자위, 눈꺼풀 안쪽)이 충혈되고 가려움증을 동반합니다.	세균 감염 등으로 인해 눈 가장자리가 붓거나 짓무름, 가려움 등의 증상이 나타납니다.

## 용법·용량

하루에 3~6회, 1회 2~3방울을 점안하십시오.

### [주의]

- (1) 정해진 용법·용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 어린이가 사용할 때는 보호자의 지도 감독 하에 사용하십시오.
- (3) 용기 끝이 눈꺼풀이나 속눈썹에 닿지 않게 하십시오. 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- (4) 소프트 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 사용하지 마십시오.
- (5) 점안용으로만 사용하십시오.

## 성분

성분	분량	효능
셀파메톡사졸 나트륨	4.0%	다래끼와 결막염을 유발하는 세균에 대한 항균 작용이 우수합니다.
글리시리진산이칼륨	0.25%	세균 감염으로 인한 눈의 염증을 가라앉혀 줍니다.
클로르페니라민말레산염	0.03%	항히스타민 작용으로 눈의 가려움증을 줄여줍니다.
타우린	0.1%	세균 감염으로 손상된 눈의 조직을 회복시켜 줍니다.

첨가물: 붕산, pH 조절제, 염화벤잘코늄, 에데트산 Na, 폴리소르베이트 80

### [주의]

본 약제를 점안하면 입안에 쓴맛 또는 단맛이 느껴질 수 있습니다. 쓴맛은 유효 성분인 셀파메톡사졸 나트륨 때문이고 단맛은 유효 성분인 글리시리진산이칼륨 때문이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

## 보관 및 취급 시 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 뚜껑을 완전히 닫아 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 달라질 수 있습니다.)
- (4) 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
- (5) 차량 대시보드와 같이 온도가 높은 곳에 방치하지 마십시오. (용기가 변형되거나 약액 품질이 저하될 수 있습니다)
- (6) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하십시오. (품질 유지를 위해)
- (7) 보존 상태에 따라 성분의 결정이 용기 입구 또는 뚜껑 안쪽에 묻을 수 있습니다. 이 때는 깨끗한 거즈로 가볍게 닦아낸 후 사용하십시오.



## 다래끼 관련 주의사항

눈을 비비거나 그 밖에 눈에 자극을 주지 않도록 주의하십시오. (다래끼는 체질적으로 잘 생기기도 하지만 과로나 수면 부족으로 인해 체력이 약해져도 잘 생기므로 과로를 피하고 충분한 수면을 취하시기 바랍니다)

## 안약 점안 시 주의사항과 올바른 점안 방법

### 주의

- 용기 끝이 눈꺼풀이나 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 잡균 등으로 인해 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있으므로 주의하십시오.

### 올바른 점안 방법

- 손을 잘 씻고 눈에 직접 손가락이 닿지 않도록 하십시오.
- 살짝 고개를 들고 손가락으로 아래 눈꺼풀을 내린 후 눈꺼풀 안쪽에 방울을 떨어뜨립니다.



### [다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변적이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.