

*2024年8月修訂
(使用上的注意事項的修訂)

使用前請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以備不時之需。

用於麥粒腫、結膜炎 **第二類醫藥品** (眼藥水)

NEW SULFAGLYCYR IRIS

◆ NEW SULFAGLYCYR IRIS 為含對於引起麥粒腫、結膜炎的病菌發揮優異殺菌力的持久型抗菌劑磺胺甲噁唑鈉，以及舒緩眼睛發炎、發癢成分的眼藥水。



使用上的注意事項

請務必閱讀!



❌ 禁止事項

(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，
或者容易引發副作用)

❶ 符合下列情形者請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分而引發過敏症狀的人。*

❷ 請勿長期連續使用

👨‍⚕️ 諮詢事項

❶ 下列人士使用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (3) 有下列症狀的人。
劇烈的眼睛痛



❷ 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止使用， 並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

*曾發生下列罕見嚴重症狀。如遇到此類情況，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

❸ 若使用3~4天左右症狀卻未見改善，請停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效

麥粒腫、結膜炎 (流行性結膜炎)、眼瞼炎 (眼瞼潰爛)、眼睛癢

用於這些眼睛症狀

麥粒腫



睫毛根部及其周圍細菌感染，而引起發炎。眼瞼紅腫且伴隨發癢。

結膜炎
(流行性結膜炎)



在游泳池等環境中感染的案例常見，造成結膜 (眼白、眼瞼內) 充血並伴隨發癢。

眼瞼炎
(眼瞼潰爛)



因細菌感染等造成眼瞼邊緣腫脹、潰爛、發癢等症狀。

用法及用量

1 天 3~6 次，1 次點眼 2~3 滴。

[注意]

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。
- (5) 僅供點眼使用。

成分

成分	分量	效用
磺胺甲噁唑鈉	4.0%	對於引起麥粒腫、結膜炎的病菌發揮優異殺菌力。
甘草酸鉀	0.25%	舒緩因細菌感染等造成的眼睛發炎。
縮水蘋果酸羧芬尼拉明	0.03%	透過抗組織胺作用，抑制眼睛發癢。
牛磺酸	0.1%	促進因細菌感染而受損之眼組織的修復。

添加物：硼砂、pH 調節劑、苯扎氯銨、乙二胺四乙酸二鈉、聚山梨醇酯 80

[注意]

本藥劑點眼後，口中可能感到苦味或甜味，苦味是有效成分磺胺甲噁唑鈉所造成，甜味則為有效成分的甘草酸鉀所造成，無須擔憂。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿放置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- (6) 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。(為確保品質)
- (7) 依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。



關於麥粒腫的注意事項

請注意不要揉眼睛，也不要讓眼睛受到其他刺激。(此外麥粒腫雖有時是因體質而容易罹患，但過勞或睡眠不足等導致體力低下時也容易發生，因此請避免過勞並注意充分補充睡眠)

點眼藥水時的注意事項與正確的點眼方式

注意

- 瓶口接觸眼瞼、睫毛可能沾附眼屎或雜菌等而造成藥劑污染或藥水混濁，請特別注意。

正確點眼方式

- 請將雙手徹底洗淨，且手指請勿直接碰觸到眼睛。
- 請臉稍微朝上，用手指拉動下眼瞼，將藥液滴在眼瞼內側。



【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。