

麦粒肿、结膜炎

ANTIMICROBIAL IRIS 2类药品 (眼药水)

- ANTIMICROBIAL IRIS是一种能有效治疗由细菌引起的麦粒肿、结膜炎等眼病，且不含防腐剂的一次性无刺激柔和眼药水。



使用注意事项

务必阅读!



禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易发生不良反应)

- 下述人群请勿使用
因本品或本品的成分发生过敏症状者。*
- 请勿长期连续使用



咨询事项

- 下述人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册销售商
(1) 正在接受医生治疗者。
(2) 曾因药物等发生过敏症状者。
(3) 有下述症状者。
剧烈的眼痛
- 使用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商



相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀

*可能会偶尔出现下述严重症状。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音嘶哑、 喷嚏、喉咙发痒、憋闷、心悸、意识混浊等。

- 如果使用3~4天左右症状仍未改善，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

功效

麦粒肿、结膜炎(红眼)、睑炎(眼睑发炎)、眼睛发痒

适用于以下眼部症状

麦粒肿



睫毛根部及其附近细菌感染，引起炎症。眼脸红肿，伴有瘙痒。

结膜炎
(红眼)



在游泳池等场所发生感染的案例较多，结膜(眼白、眼脸内侧)会充血，并伴有瘙痒。

睑炎
(眼睑发炎)



由于细菌感染等会出现眼脸边缘肿胀、发炎和发痒等症状。

成分

成分	含量	作用
磺胺甲噁唑钠	4.0%	对麦粒肿及结膜炎的致病菌有显著的抗菌作用。
甘草酸二钾	0.1%	缓解因细菌感染等原因引起的眼睛炎症。

辅料：pH调节剂、其他1种成分

[注意事项]


本品滴眼后，口中可能会感觉有苦味或甜味，苦味是活性成分磺胺甲噁唑钠引起，甜味是活性成分甘草酸二钾引起，无需担心。

用法用量


请按每天3~6次，每次2~3滴点眼。

[使用方法]

① 请勿强行拉扯，慢慢地转动盖子打开。




② 请按每天3~6次，每次2~3滴点眼。（每支可滴两只眼睛）



③ 为易于药液挤出，容器中装入的量略多，但是一旦开封后，即使有药液剩余，也请务必丢弃。

垃圾分类为塑料垃圾。



[注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 请不要让容器的尖端碰到眼皮、睫毛。并且，请勿使用浑浊的眼药水。
- (4) 请勿在佩戴软性隐形眼镜的状态下使用。
- (5) 请只用于点眼。
- (6) 请勿强行拉扯开封。另请注意，如果用力完全开封，药液可能会飞溅。
- (7) 本品为“一次性使用型”滴眼剂，不含防腐剂，使用后的剩余药液请丢弃。



请小心不要被容器的尖端伤到眼睛。

储存及操作注意事项

- (1) 请存放在避免阳光直射的阴凉场所。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。（否则会导致误用或变质）
- (4) 请勿与他人共用。
- (5) 本品虽然使用有色容器和有色袋防止药液因光线而变质，但是在贮存时请于避光处储存，如将其放回盒内。另外，请勿储存在冰箱内。
- (6) 请勿放置在车辆仪表盘等高温部位。（否则会导致容器变形或药液质量劣化）
- (7) 将产品放在裤子后袋等可能会导致盖子打开，敬请注意。
- (8) 请勿使用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后也请尽早使用。（为保证质量）



关于麦粒肿的注意事项

请小心不要揉眼脸或对眼睛进行其他刺激。（此外，虽然某些体质容易发生麦粒肿，但因疲劳过度或睡眠不足等原因导致体力下降时更易引发麦粒肿，因此注意保证充足睡眠，避免疲劳过度）

[关于多语言产品信息时的免责声明]

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。