

◆抗菌Iris眼药水有效治疗细菌感染引起的麦粒肿、结膜炎等眼睛疾病，是不含防腐剂的1次性使用包装产品，具有不刺激温和舒适的使用效果。

效能或效果

结膜炎（流行性角结膜炎）、针眼、眼睑炎（眼睑糜烂）、眼睛发痒

用法及用量

请按1天3~6次，1次2~3滴点眼。
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
请勿戴着软性隐形眼镜使用。
仅限作为滴眼药水使用。
开封时请勿强行拉开。此外，开封时用力可能会使药液飞散，因此请注意。
本药剂为"1次性"滴眼液不含防腐剂，因此使用后的剩余液体请倒掉。

成分及分量

Sodium Sulfamethoxazole 4%
Dipotassium Glycyrrhizinate 0.1%

添加剂

pH adjusting agent, Other one-component

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

眼睛剧烈疼痛

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

眼睛：

充血

发痒

红肿

- 若使用3~4天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）

请勿与其他人共用

本药剂为了防止光线引起药液变质而使用了染色容器、染色袋，保管时请放回盒子中等，置于光线照射不到的场所保管。且，请勿放在冰箱中保管。

请勿置于汽车的仪表板等高温下。（会发生容器变形或药液的质量劣化）

请注意如果将产品放进裤子的后口袋等，盖子有可能会打开。

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任