

다래끼·결막염에

ANTIMICROBIAL IRIS

제2류 의약품(일반의약품)

<안약>

◆ **ANTIMICROBIAL IRIS**는 세균으로 인해 생기는 다래끼·결막염과 같은 안질환을 효과적으로 치료합니다. 또한 방부제가 들어 있지 않은 일회용 타입으로, 자극 없이 부드럽게 점안할 수 있는 안약입니다.



사용 시 주의사항



금지 사항

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용이 생길 수 있습니다)

① 다음과 같은 사람은 사용하지 마십시오

본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.*

② 장기간 연속해서 사용하지 마십시오



상담

① 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

- (1) 의사에게 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람.
극심한 눈 통증

② 사용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오



관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부기

* 드물게 다음과 같은 위중한 증상이 나타날 수 있습니다. 이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	사용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 쉼, 재채기, 목구멍 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 증상이 발현한다.

③ 3~4일간 사용해도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

효능

다래끼, 결막염(유행성 결막염), 안검염(눈꺼풀 짓무름), 눈 가려움

이러한 눈의 증상에는

다래끼



눈썹 뿌리 부분과 그 부근에 세균이 감염되어 염증을 일으킨 것. 눈꺼풀이 붉게 붓고 가려움을 동반합니다.

결막염 (유행성 결막염)



수영장에서 감염되는 사례가 많으며 결막(흰자위, 눈꺼풀 안쪽)이 충혈되고 가려움증을 동반합니다.

안검염 (눈꺼풀 짓무름)



세균 감염 등으로 인해 눈 가장자리가 붓거나 짓무름, 가려움 등의 증상이 나타납니다.

성분

성분	분량	효능
설파메톡사졸 나트륨	4.0%	다래끼와 결막염을 유발하는 세균에 대한 항균 작용이 우수합니다.
글리시리진산이칼륨	0.1%	세균 감염으로 인한 눈의 염증을 가라앉혀 줍니다.

첨가물: pH 조절제, 기타 1개 성분

[주의]


본 약제를 점안하면 입안에 쓴맛 또는 단맛이 느껴질 수 있습니다. 쓴맛은 유효 성분인 설파메톡사졸 나트륨 때문이고 단맛은 유효 성분인 글리시리진산이칼륨 때문이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

용법·용량

하루에 3~6회, 1회 2~3방울을 점안하십시오.

[사용 방법]

① 무리하게 당기지 말고 뚜껑 부분을 천천히 돌려 여십시오.



② 하루에 3~6회, 1회 2~3방울을 점안하십시오. (1개로 양쪽 눈에 점안할 수 있습니다)



③ 약액이 잘 밀려나올 수 있도록 용기에는 약액이 약간 넘치게 담겨 있는데 일단 개봉한 것은 약액이 남아 있더라도 반드시 버리십시오.

플라스틱으로 분류하십시오.



[주의]

- (1) 정해진 용법·용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 어린이가 사용할 때는 보호자의 지도 감독 하에 사용하십시오.
- (3) 용기 끝이 눈꺼풀이나 속눈썹에 닿지 않게 하십시오. 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- (4) 소프트 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 사용하지 마십시오.
- (5) 점안용으로만 사용하십시오.
- (6) 무리하게 당겨서 개봉하지 마십시오. 힘을 주어 개봉하면 약액이 될 수 있으므로 주의하십시오.
- (7) 본 약제는 방부제가 함유되지 않은 '일회용 타입' 점안제이므로 사용 후 남은 약액은 버리십시오.



용기 끝이 눈이 손상되지 않도록 주의하십시오.

보관 및 취급 시 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 달라질 수 있습니다)
- (4) 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
- (5) 본 약제는 빛으로 인한 약액 변질을 방지하기 위해 유색 용기·유색 봉지에 담겨 있지만 보관할 때는 상자에 다시 넣는 등 빛이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 냉장 고에는 보관하지 마십시오.
- (6) 차량 대시보드와 같이 온도가 높은 곳에 방치하지 마십시오. (용기가 변형되거나 약액 품질이 저하될 수 있습니다)
- (7) 바지 뒷주머니에 제품을 넣으면 뚜껑이 열릴 수 있으므로 주의하십시오.
- (8) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하십시오. (품질 유지를 위해)



다래끼 관련 주의사항

눈을 비비거나 그 밖에 눈에 자극을 주지 않도록 주의하십시오. (다래끼는 체질적으로 잘 생기기도 하지만 과로나 수면 부족으로 인해 체력이 약해져도 잘 생기므로 과로를 피하고 충분한 수면을 취하시기 바랍니다)

[다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.