

用於麥粒腫、結膜炎

ANTIMICROBIAL IRIS

第二類醫藥品

(眼藥水)

◆ANTIMICROBIAL IRIS 是有效治療細菌所造成的麥粒腫、結膜炎等眼疾，不含防腐劑的單劑量包裝，不刺激的溫和性眼藥水。



使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，
或者容易引發副作用)

1 符合下列情形者請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

2 請勿長期連續使用



諮詢事項



1 下列人士使用前，請先諮詢醫師、 藥劑師或登錄販賣者

- (1)正在接受醫師治療者。
- (2)曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (3)有下列症狀的人。
劇烈的眼睛痛

2 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止 使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

*曾發生下列罕見嚴重症狀。如遇到此類情況，請立刻接受醫師
診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、 打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識 模糊等。

3 若使用 3~4 天左右症狀卻未見改善，請停止使用，並攜 帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效

麥粒腫、結膜炎 (流行性結膜炎)、眼瞼炎 (眼瞼潰爛)、眼睛癢

用於這些眼睛症狀

麥粒腫



睫毛根部及其周圍細菌
感染，而引起發炎。眼
瞼紅腫且伴隨發癢。

結膜炎
(流行性結膜炎)



在游泳池等環境中感染
的病例常見，造成結膜
(眼白、眼瞼內)充血
並伴隨發癢。

眼瞼炎
(眼瞼潰爛)



因細菌感染等造成眼瞼
邊緣腫脹、潰爛、發癢
等症狀。

成分

成分	分量	效用
磺胺甲噁唑鈉	4.0%	對於引起麥粒腫、結膜炎的病菌發揮優異殺菌力。
甘草酸鉀	0.1%	舒緩因細菌感染等造成的眼睛發炎。

添加物：pH 調節劑、其他成分 1

[注意]


本藥劑點眼後，口中可能感到苦味或甜味，苦味是有效成分磺胺甲噁唑鈉所造成，甜味則為有效成分的甘草酸鉀所造成，無須擔憂。

用法及用量


1 天 3~6 次，1 次點眼 2~3 滴。

[使用方法]

① 勿用力拉扯，請慢慢旋轉蓋子部分開封。




② 1 天 3~6 次，1 次點眼 2~3 滴。(1 瓶可點兩眼)



③ 為了讓藥液更容易擠出，容器中裝入了稍多藥液，但只要一經開封，即便有藥液殘留也請務必丟棄。

請分類為塑膠垃圾。



[注意]

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。
- (5) 僅供點眼使用。
- (6) 請勿用力拉扯開封。此外，開封時用力過度可能造成藥液噴濺，敬請留意。
- (7) 本藥劑為「單次使用型」的點眼劑，不含防腐劑，未用盡的殘餘藥液請廢棄。



請注意避免容器前端弄傷眼睛。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陰涼處，避免日光直射。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 本藥劑為避免光線造成藥液變質而使用有色遮光瓶、有色遮光袋，保存時請收入外盒並置於避免受光線照射之處保管。此外，請勿存放於冰箱內。
- (6) 請勿放置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- (7) 收於褲子後側口袋等處可能造成瓶口開啟，敬請留意。
- (8) 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早使用完畢。(為確保品質)



關於麥粒腫的注意事項

請注意不要揉眼睛，也不要讓眼睛受到其他刺激。(此外麥粒腫雖有時是因體質而容易罹患，但過勞或睡眠不足等導致體力低下時容易發生，因此請避免過勞並注意充分補充睡眠)

[提供多語言產品資訊時的免責聲明]

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考，並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。