

# TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE <ORAL LIQUID>

第二类医药品  
肠胃药

## 效能或效果

饮酒过量、恶心（宿醉与醉酒想吐、想吐、反胃、呕吐、恶心）、食欲不振、消化不良、胃部和腹部胀满感、胃弱、吃得过多、烧心、胃胀、胸闷、呕吐

## 用法及用量

成年人（15岁以上），1天3次，1次1瓶，请在饭前或饭间服用。

饭间服用，要以饭后2~3小时为基准。

请严格遵守规定的用法用量。

本药剂含有生药成分，随着时间流逝会发生沉淀，但药效不会变化。服用时请摇匀后服用。

## 成分及分量

1支（30mL）中

Goreisanryo Dry Extract 0.3 g 0.3g (equivalent to 0.833 g of Alisma Tuber,0.750 g of Poria Sclerotium,0.500 g of Cinnamon Bark,0.750 g of Polyporus Sclerotium,0.750 g of Anractylodes Rhizome)

Orengedokuto Dry Extract 0.3g (equivalent to 0.333g of Coptis rhizome, 0.333g of Phellodendron bark, 0.333g of Gardenia fruit, 0.5g of Scutellaria root)

## 添加剂

Sugar,D-Sorbitol ,citric acid,Sodium benzoate,Butyl parahydroxybenzoate,Polysorbate 80,Anhydrous ethanol,Other two-component

## 使用注意事项

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本产品咨询医生、药剂师或登录贩卖者

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

肠系膜静脉硬化症：长期服用导致腹痛、腹泻、便秘、腹胀等症状反复出现。

●若服用1个月左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

●若长期连续服用时，应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请勿服用超过使用期限的产品。

本药剂的包装为1次喝1个，如果开封请全部喝完。请勿开着封保管

51

### 【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任