

大正漢方胃腸薬〈内服液〉

効能・効果

飲みすぎ、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、食欲不振、消化不良、胃部・腹部膨満感、胃弱、食べ過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、嘔吐

用法・用量

成人（15才以上）1回1びん1日3回食前又は食間に服用してください。
食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします
定められた用法・用量を厳守してください。
本剤は、生薬成分を含むため、経時的に沈殿いたしますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成分及び分量

1本（30mL）中
五苓散料水製乾燥エキス 0.3g（タクシャ0.833g、ブクヨウ・チョレイ・ビャクジュツ各0.75g、ケイヒ0.5g）
黄連解毒湯水製乾燥エキス 0.3g（オウレン・オウバク・サンシシ各0.333g、オウゴン0.5g）

添加物

白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、ポリソルベート80、エタノール、その他2成分

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
腸間膜静脈硬化症：長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあられる。
- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
小児の手のとどかない所に保管してください。
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
本剤は1回1本飲みきりですので、封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください

51

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。