

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

胃のもたれ・不快感に <微粒>

大正漢方胃腸薬

第2類医薬品
(胃腸薬)

- ◆胃腸は動きが鈍くなると、胃のもたれなど不快な症状が起きることがあります。一方で過度な動き・筋肉の緊張によって胃痛、腹痛などが起きることがあります。
- ◆大正漢方胃腸薬は、安中散と芍薬甘草湯の組み合わせによって、胃腸の動きを整えて、胃腸を本来の状態に近づけていきます。

胃腸の疲れなどによる胃のもたれ・不快感に



- ◆ふだんから胃腸が弱く、不規則な食生活や夏バテなどで胃腸が不調である、食欲が出ないといった方に適した胃腸薬です。食事を美味しく楽しみたい方、疲れた胃の調子を改善したい方などの胃のもたれ・不快感、胃炎等の胃腸症状を改善します。
- ◆胃痛・腹痛にも効果があります。
- ◆香り・風味が良い微粒タイプです。
- ◆5才から高齢者まで服用頂けます。



使用上の注意



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



効能

胃のもたれ、胃部不快感、胃炎、胃痛、げっぷ、食欲不振、腹部膨満感、胸つかえ、胸やけ、胃酸過多、腹痛、はきけ(むかつき、悪心)

こんな時に



胃のもたれ、胃部不快感



胃炎、胃痛



げっぷ、食欲不振

用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。 21

Please ensure that you read the instructions carefully before use. Store this instruction leaflet in a safe place for later reference.

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE

<GASTROINTESTINAL MEDICINE> <GRANULES>

- ◆Sluggish movement of the stomach and intestines can cause unpleasant symptoms, such as heavy stomach feeling. On the other hand, excessive movement and muscle tension may cause stomach pain and abdominal pain.
- ◆Taisho Kampo Stomach Medicine is a combination of Anchuosan and Shakuyaku-Kanzotou, which balances the movement of the gastrointestinal tract and helps to restore the normal function of the gastrointestinal tract.
- ◆It is a gastrointestinal medicine suitable for people who usually have weak or poor gastrointestinal tract function due to irregular eating habits or summer heat fatigue, or have no appetite. This medicine improves gastrointestinal symptoms such as heavy stomach feeling/discomfort and gastritis in patients who want to enjoy a palatable diet and improve their fatigued stomach condition.
- ◆It is also effective for stomach pain and abdominal pain.
- ◆It consists of fine grains with a good aroma and flavor.
- ◆This medicine can be taken from 5 years of age to an advanced age.

CAUTIONS FOR USE

[Consult a physician for the following]

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration. Patients receiving medical treatment under the direction of a physician
2. If the following symptoms are observed after taking this medicine, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this medicine, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Related area	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching

The following serious symptoms may occur in rare cases. In such cases, immediately seek medical aid:

Symptoms' name	Symptoms
Liver dysfunction	Fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and the whites of the eyes), brown urine, general malaise, loss of appetite, etc. may occur.


3. When symptoms do not improve even after taking this medicine for about 1 month, stop taking the medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson. Make sure that you take this instruction leaflet with you.

EFFICACY

Heavy stomach feeling, feeling of discomfort in the stomach, gastritis, stomach ache, belching, loss of appetite, feeling of abdominal distention, pressure on the chest, heartburn, hyperchlorhydria, abdominal pain, nausea (churning of stomach and vomituration)

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1包 	1日3回
5才~14才	1/2包 	
5才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

食間の服用は、食事の後2~3時間を目安にします

☆大正漢方胃腸薬を食前又は食間に服用するわけ☆

一般に漢方薬は胃の中がからになっている方が薬効成分が効率よく吸収されると考えられているので、大正漢方胃腸薬の服用時期も「食前又は食間」に設定しています。



成分

1包(1.02g)中

成分	分量	はたらき
安中散 (下記生薬の混合粉末) ケイヒ(桂皮) 200mg エンゴサク(延胡索) 150mg ホレイ(牡蠣) 150mg ウイキョウ(茴香) 75mg シュクシャ(縮砂) 50mg カンゾウ(甘草) 50mg リョウキョウ(良姜) 25mg	700mg	衰えた胃腸のはたらきを活発にする作用があり、胃のもたれ、胃部不快感、胃炎等の症状を改善します。 
芍薬甘草湯エキス シャクヤク(芍薬) 280mg カンゾウ(甘草) 280mg	140mg 280mg 280mg	胃腸の筋肉の異常な緊張をやわらげる作用があり、胃痛や腹痛等をしずめます。 

添加物：無水ケイ酸、バレシヨデンブ、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク

【注意】本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



治療のポイント

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

本剤を服用されるほか、日常生活でも次の点にご注意ください。

- ◆薬飲食物に注意し、三度の食事を規則正しくとり、生活リズムを一定に保ちましょう。
- ◆タバコ、アルコール類、コーヒーなどの嗜好品を取りすぎないようにしましょう。
- ◆現代の複雑な社会ではストレスはさげられません。上手な解消法をみつけましょう。
- ◆規則正しい生活を心がけましょう。夜ふかしや睡眠不足は胃を荒らす原因になります。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

DOSAGE AND DIRECTIONS

Take the following dose with cold or lukewarm water before a meal or between meals.

Age	One dose	Daily dosage
15 years or over	1 packet per dose	3 times daily
5 to 14 years	1/2 packet per dose	
Under 5 years	Do not use	

【Cautions】

- (1) Comply with the prescribed dosage and directions.
 - (2) The use of the medicine in children should be supervised by a parent.
- Take the medicine between meals around 2 to 3 hours after meals.

COMPOSITION In 1 packet (1.02g)

Components	Content	Activity
Anchusan (Mixed powder of crude drugs below)	700mg	This medicine actively rejuvenates debilitated gastrointestinal function and improves symptoms such as heavy stomach feeling, gastric discomfort and gastritis.
Cinnamon bark	200mg	
Corydalis tuber	150mg	
Oyster shell	150mg	
Fennel	75mg	
Amomum seed	50mg	
Glycyrrhiza	50mg	
Alpinia officinarum Rhizome	25mg	
Shakuyakukanzoto Extract	140mg	This medicine relieves abnormal tension in the gastrointestinal muscles. It consequently relieves gastric and abdominal pain.
Peony root	280mg	
Glycyrrhiza	280mg	

Additives: anhydrous silicic acid, potato starch, lactose, cellulose, hydroxypropylcellulose, talc

【Notes】

The medicine contains herbal preparations as the raw ingredients. The color of the medicine may differ slightly, but this does not affect efficacy.

CAUTIONS ON HANDLING AND STORAGE

- (1) Avoid direct sunlight, and store the product in a cool place where humidity is low.
- (2) Store the product out of reach of children.
- (3) Do not transfer the medicine to other containers as this may lead to misuse or quality deterioration.
- (4) If you divide a pack to take half immediately and the rest afterward, fold down the opening of the bag prior to storing it, and take it within 2 days.
- (5) Do not take the product if the expiration date has passed.

If you have any questions regarding this medication, ask at the store you bought it from or contact the following number:

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Customer Hotline

Telephone: 03-3985-1800

Office hours: 8:30-21:00 (excluding Saturdays, Sundays and National holidays)

Production of this product has been approved for domestic sales in accordance with the Pharmaceutical Affairs Law of Japan.



大正製薬株式会社
 東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://brand.taisho.co.jp/kanpou/>

KYON1