

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE GRANULES

第二類醫藥品

◆大正漢方腸胃藥為以安中散與芍藥甘草湯調配而成的腸胃藥，適合日常腸胃虛弱、不規則飲食作息或夏日倦怠症所造成的腸胃失調、食慾不振的族群。■為希望享受美食、希望改善疲憊胃部者緩解胃飽脹、不適感、食慾不振等腸胃症狀。■香味、風味皆宜的細微顆粒劑型。

療效或效果

胃脹、胃部不適、胃炎、胃痛、打嗝、食慾不振、腹部膨脹感、胸悶、胸口灼熱、胃酸過多、腹痛、噁心（反胃、噁心）

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

- 15歲以上，1天3次，1次1包
 - 5歲～14歲，1天3次，1次1/2包
 - 未滿5歲者，請勿使用
- 請務必遵守規定用法、用量。
兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

成分及分量

1包（1.2g）中
Anchusan 700mg (equivalent to 200mg of Cinnamon bark, 150mg of Corydalis tuber, 150mg of Oyster shell, 75mg of Fennel, 50mg of Amomum seed, 50mg of Glycyrrhiza, 25mg of Ryokyo)
Powdered Shakuyakukanzoto Extract 140mg (Peony root 280mg, Glycyrrhiza 280mg)

添加劑

anhydrous silicic acid, Potato starch, Lactose, cellulose, Hydroxypropylcellulose, Talc

使用上的注意事項

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者正在接受醫師治療的人。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者皮膚：
發疹、發紅
發癢
極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
- 即使用1個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。
請勿服用超過使用期限的產品。

12

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。