

# TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE <TABLETS>

第二类医药品  
肠胃药

◆大正汉方肠胃药(药片)是安中散和芍药甘草汤的组合药剂, 适合于平时肠胃弱、因饮食不规律或苦夏等导致肠胃不适、无食欲等症状的人群。■针对想要好好享受饮食的人、想要改善疲惫的胃部状态的人等, 可以改善胃胀、不适感、食欲不振等肠胃症状。■此药剂为易服用的小型药片。

## 效能或效果

胃胀、胃部不适感、胃炎、胃痛、打嗝、食欲不振、腹部胀满感、胸闷、烧心、胃酸过多、腹痛、恶心(想吐、恶心)

## 用法及用量

在饭前或饭间, 请按以下用量并配合水或温开水服用:

15岁以上, 1天3次, 1次4片

5岁~14岁, 1天3次, 1次2片

未满5岁, 不宜使用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时, 请在监护人的指导监督下服用。

请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。(有可能会成为变色等原因, 导致质量改变)

## 成分及分量

4錠中

Anchusan 700mg (equivalent to 200mg of Cinnamon bark, 150mg of Corydalis tuber, 150mg of Oyster shell, 75mg of Fennel, 50mg of Amomum seed, 50mg of Glycyrrhiza, 25mg of Ryokyo)

Powdered Shakuyakukanzoto Extract 140mg (Peony root 280mg, Glycyrrhiza 280mg)

## 添加剂

Hydroxypropylcellulose, anhydrous silicic acid, Lactose, Magnesium stearate, hardened oil

### 成分及分量相关注意

本药剂使用生药作为原料, 因此不同产品的颜色等会有所不同, 但是效果不变

## 使用注意事项

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

●服用后若出现下述症状, 则可能存在副作用, 此时应立即中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤:

起疹、发红

发痒

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

肝功能障碍: 出现发烧、发痒、起疹、黄疸(皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

●若服用1个月左右后症状仍无改善则应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射(潮气小)的阴凉场所(密闭)。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)

请勿服用超过使用期限的产品。此外, 即使在使用期限内, 开封后请在6个月以内服用。(为了保证质量)

22

### 【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的, 基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的, 仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方(或本公司)临时翻译而成, 未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题, 提供方(或本公司)概不承担一切责任