

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE <TABLETS>

第二類醫藥品
胃腸藥

◆大正漢方腸胃藥(錠劑)為以安中散與芍藥甘草湯調配而成的腸胃藥，適合日常腸胃虛弱、不規則飲食作息或夏日倦怠症所造成的腸胃失調、食慾不振的族群。■為希望享受美食、希望改善疲憊胃部者緩解胃飽脹、不適感、食慾不振等腸胃症狀。■易於服用的小型錠劑。

療效或效果

胃脹、胃部不適、胃炎、胃痛、打嗝、食慾不振、腹部膨脹感、胸悶、胸口灼熱、胃酸過多、腹痛、噁心（反胃、噁心）

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

15歲以上，1天3次，1次4片

5歲～14歲，1天3次，1次2片

未滿5歲者，請勿使用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分及分量

4片中

Anchusan 700mg (equivalent to 200mg of Cinnamon bark, 150mg of Corydalis tuber, 150mg of Oyster shell, 75mg of Fennel, 50mg of Amomum seed, 50mg of Glycyrrhiza, 25mg of Ryokyo)

Powdered Shakuyakuzoto Extract 140mg (Peony root 280mg, Glycyrrhiza 280mg)

添加劑

Hydroxypropylcellulose, anhydrous silicic acid, Lactose, Magnesium stearate, hardened oil

成分及分量相關的注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

●即使服用1個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

22

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责事项】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。