

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE "SAWAWA" GRANULES

제2류 의약품
위장약

◆다이쇼 한방 위장약 '사와와' 미립은 Anchusan과 Shigyakusan의 조합으로 인해 평소부터 각종 스트레스를 받고 자율신경이 흐트러져 있는 현대인에게 적합한 처방으로 개발한 위장약입니다. ■스트레스를 잘 발산하지 못하시는 분, 일이나 가사가 바빠서 분발하고 계신 분 등의 위 통증과 더부룩함 등 위장 증상을 개선합니다. ■독자적인 제제기술로 인해 향과 풍미가 좋은 제제를 실현했습니다.(방향성 건위 생약 배합)

효능 또는 효과

체력 중등도 또는 다소 허약하여 때로 흉복부의 묵직함, 불안·불면, 초조함 등의 증상이 있는 분의 다음의 제증상: 더부룩함, 위부 불쾌감, 위통, 트림, 식욕부진, 위부·복부 팽만감, 위 답답함, 속쓰림, 위산 과다, 복통, 메스꺼움(역함, 구역질), 신경성 위염

용법 및 용량

다음의 양을 식전 또는 식간에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

15세 이상, 1회 1포, 1일 3회

15세 미만, 복용하지 말 것

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

성분 및 분량

In 1 packet (1.4 g)

Anchusan 700mg (equivalent to 200mg of Cinnamon bark, 150mg of Corydalis tuber, 150mg of Oyster shell, 75mg of Fennel, 50mg of Amomum seed, 50mg of Glycyrrhiza, 25mg of Ryokyo)

Shigyakusan Dry Extract 303.33mg (equivalent to 333.33mg of Bupleurum root, 333.33mg of Immature orange, 333.33mg of Peony root, 166.67mg of Glycyrrhiza)

첨가물

Dextrin, anhydrous silicic acid, Powdered sugar, cellulose, Hydroxypropylcellulose, Sucralose, Talc

성분 및 분량에 관한 주의

본제는 생약을 원료로 사용하고 있으므로 제품에 따라 색조 등에 다소 차이가 있을 수 있으나, 효과는 변함 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

●다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

지금까지 약 등으로 인해 발진·발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람.

신체가 허약한 사람(체력이 떨어진 사람, 몸이 약한 사람)

●복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

피부:

발진·발적

가려움

●1주일 정도 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

22

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

·본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.

·다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.

·다언어 제품 정보는 제공사(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.

·다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공사(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..