

TAISHO STOMACH MEDICINE K

第二类药品
肠胃药

◆大正肠胃药K是用芍药甘草汤精华粉和安中散配制的肠胃药。■用这2种处方配制的大正肠胃药K，对于改善胃痛以及胃胀、胃炎在内的肠胃的各种症状均有效果。

效能或效果

胃痛、胃胀、胃炎、胃部不适感、食欲不振、打嗝、腹痛、烧心、恶心、胃酸过多、腹部胀满感

用法及用量

在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用：

15岁以上，1天3次，1次1包

5岁～14岁，1天3次，1次1/2包

未满5岁，不宜使用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分及分量

1包（1.2 g）中

Anchusae 700mg (equivalent to 200mg of Cinnamon bark, 150mg of Corydalis tuber, 150mg of Oyster shell, 75mg of Fennel, 50mg of Amomum seed, 50mg of Glycyrrhiza, 25mg of Rykyo)

Powdered Shakuyakuanzoto Extract 170mg (Peony root 340mg, Glycyrrhiza 340mg)

添加剂

anhydrous silicic acid, Potato starch, Lactose, cellulose, Hydroxypropylcellulose, Talc

成分及分量相关注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

老年人

拥有以下症状的人群

浮肿

接受以下诊断的人群

高血压

肾脏病

心脏病

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

●若服用1个月左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

●若长期连续服用时，应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

将1包分开服用时，折叠袋口进行保管，并在2天之内服用。

请勿服用超过使用期限的产品。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责事项】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任