

TAISHO STOMACH MEDICINE K

- ◆TAISHO STOMACH MEDICINE K 是用芍药甘草汤精华和安中散配制的肠胃药。
- ◆用这 2 种处方配制的 TAISHO STOMACH MEDICINE K，对于改善胃痛以及胃胀、胃炎在内的肠胃的各种症状均有效果。

效能

胃痛、胃胀、胃炎、胃部不适感、食欲不振、打嗝、腹痛、烧心、恶心、胃酸过多、腹部胀满感

用法及用量

请按以下用量，在餐前或餐间用水或温水服用。

15 岁以上，1 次 1 包，1 天 3 次

5 岁~14 岁，1 次 1/2 包，1 天 3 次

未满 5 岁，请勿服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分

1 包 (1.2g) 中

安中散 700mg

(桂皮 200mg, 延胡索 150mg, 牡蛎 150mg, 茴香 75mg, 缩砂 50mg, 甘草 50mg, 良姜 25mg)

芍药甘草汤香 170mg

(芍药 340mg, 甘草 340mg)

添加剂

二氧化硅, 马铃薯淀粉, 乳糖, 纤维素, 羟丙基纤维素, 滑石

注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变。

使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
老年人。
拥有以下症状的人群。
浮肿
接受以下诊断的人群。
高血压, 肾脏病, 心脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。
- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转时，请停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 如果长期连续服用时，请咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 1 包分次服用时，请折叠袋口进行保管，并于 2 天之内服用完。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。