

TAISHO STOMACH MEDICINE K

- ◆TAISHO STOMACH MEDICINE K 是用芍藥甘草湯萃取物與安中散調配而成的腸胃藥。
- ◆含上述 2 大配方的 TAISHO STOMACH MEDICINE K 有效緩解胃痛、胃飽脹、胃炎等各種腸胃症狀。

療效

胃痛、胃脹、胃炎、胃部不適、食慾不振、打嗝、腹痛、胸口灼熱、噁心、胃酸過多、腹部膨脹感

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用。

15 歲以上，1 次 1 包，1 天 3 次

5 歲~14 歲，1 次 1/2 包，1 天 3 次

未滿 5 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

成分

1 包 (1.2g) 中

安中散 700mg

(桂枝 200mg, 延胡索 150mg, 牡蠣 150mg, 茴香 75mg, 縮沙 50mg, 甘草 50mg, 良薑 25mg)

芍藥甘草湯香 170mg

(芍藥 340mg, 甘草 340mg)

添加劑

二氧化矽, 馬鈴薯澱粉, 乳糖, 纖維素, 羥丙基纖維素, 滑石

注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
年長者。
有下列症狀的人。
浮腫
接受過下列診斷的人。
高血壓，腎臟病，心臟病
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅，發癢
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。
- 如果服用 1 個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜同本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 長期連續服用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 1 包分次服用時，請將袋口反折保管並於 2 天內服用完畢。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。