

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

胃痛、胃炎、胃のもたれに

大正胃腸薬K(錠剤)は、胃の緊張をほぐし、急に起こる胃痛、胃炎、胃のもたれ等の胃腸症状を改善します。

シャクヤクカンゾウトウ
芍薬甘草湯

胃の緊張をほぐす
●胃の筋肉の緊張をやわらげる
●胃の痛みを緩和する

+

アンチュウサン
安中散

本来の胃の働きを取り戻す
●低下した胃腸機能を改善する
●胃酸量を調整する

【効 能】胃痛、胃のもたれ、胃炎、胃部不快感、食欲不振、げっぷ、腹痛、胸やけ、はきけ、胃酸過多、腹部膨満感

【成 分】4錠中
安中散(下記生薬の混合粉末)700mg:
ケイヒ200mg、エンゴサク150mg、ボレイ150mg、ウイキョウ75mg、シュクシャ50mg、カンゾウ50mg、リョウキョウ25mg
芍薬甘草湯エキス170mg:
シャクヤク340mg、カンゾウ340mg
添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖、ステアリン酸Mg、硬化油

[注意]本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

230錠 胃痛、胃炎、胃のもたれに
大正胃腸薬K(錠剤)
第2類医薬品

副作用被害救済制度 0120-149-931

開封口

漢方製剤 第2類医薬品
大正胃腸薬K(錠剤)

230錠

胃痛、胃炎、
胃のもたれに

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
https://www.taisho.co.jp/

お客様119番室
03-3985-1800
※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

エコパッケージ:添付文書をなくし、紙の使用量を削減(従来品比)

開封

年月日

キャップを開けた際、ピンの口もとのシールが破れていたり、はかれている場合は服用しないでください。

【用法・用量】次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1回量	服用回数
15才以上	4錠	1日3回
5才~14才	2錠	
5才未満	服用しないこと	

●食前は食事の30分~1時間前、食間は食事の2~3時間後を目安に服用してください。

【注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)ぬれた手等で触れた錠剤は、びんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

〈最初に服用する時に〉

①瓶口シールをはがして捨ててください。

②詰め物を取り出して捨ててください。(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)

錠剤(西薬社)使用済

異種検知

【使用上の注意】
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)高齢者。
(3)次の症状のある人。むくみ、(4)次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病、心臓病
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚:発疹、発赤、かゆみ
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。
●肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
●偽アルドステロン症:ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばり感に起こることがある。
力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.1ヵ月位服用しても症状がよくなりない場合は登録販売者に相談してください。
4.長期連用する場合は医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。
(5)開封後は6ヵ月以内に服用してください。

QRコード