

TAISHO STOMACH MEDICINE K (TABLETS)

- ◆TAISHO STOMACH MEDICINE K (TABLETS) 是用芍药甘草汤精华和安中散配制的肠胃药。
- ◆用这 2 种处方配制的 TAISHO STOMACH MEDICINE K (TABLETS) ， 对于改善胃痛以及胃胀、胃炎在内的肠胃的各种症状均有效果。

效能

胃痛、胃胀、胃炎、胃部不适感、食欲不振、打嗝、腹痛、烧心、恶心、胃酸过多、腹部胀满感

用法及用量

请按以下用量，在餐前或餐间用水或温水服用。

15 岁以上，1 次 4 片，1 天 3 次

5 岁~14 岁，1 次 2 片，1 天 3 次

未满 5 岁，请勿服用

两餐之间服用时，以餐后 2~3 小时为准。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。(有可能会成为变色等原因，导致质量改变)

成分

4 片中

安中散 700mg

(桂皮 200mg, 延胡索 150mg, 牡蛎 150mg, 茴香 75mg, 缩砂 50mg, 甘草 50mg, 良姜 25mg)

芍药甘草汤香 170mg

(芍药 340mg, 甘草 340mg)

添加剂

羟丙基纤维素，二氧化硅，乳糖，硬脂酸镁，硬化油

注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变。

使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
老年人。
拥有以下症状的人群。
浮肿
接受以下诊断的人群。
高血压，肾脏病，心脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。
- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转时，请停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 如果长期连续服用时，请咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在 6 个月以内服用。(为了保证质量)

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。