

## TAISHO STOMACH MEDICINE K <TABLETS>

- ◆TAISHO STOMACH MEDICINE K <TABLETS> 는 작약감초탕 추출물과 안중산을 배합한 위장약입니다.
- ◆이들 2 가지 종류의 처방을 배합한 TAISHO STOMACH MEDICINE K <TABLETS> 는 위의 통증과 위 더부룩함, 위염을 비롯한 위장의 제증상 개선에 효과가 있습니다.

### 효능

위통, 더부룩함, 위염, 위부 불편감, 식욕 부진, 트림, 복통, 속쓰림, 메스꺼움, 위산 과다, 복부 팽만감

### 용법 및 용량

다음의 양을 식전 또는 식간에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

15 세 이상, 1 회 4 정, 1 일 3 회

5 세~14 세, 1 회 2 정, 1 일 3 회

5 세 미만, 복용하지 말 것

식간 복용은 식사 후 2~3 시간을 기준으로 합니다.

### 주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.
- 젖은 손 등으로 만진 정제는 병에 다시 넣지 마십시오. (변색 등의 원인이 되며, 품질이 변할 수 있습니다)

### 성분

In 4 tablets

안중산 700mg

(계피 200mg, 현호색 150mg, 모려 150mg, 회향 75mg, 측사 50mg, 감초 50mg, 양강 25mg)

작약감초탕 추출물 170mg

(작약 340mg, 감초 340mg)

### 첨가물

하이드록시프로필셀룰로오스, 무수 규산, 젓당, 마그네슘스테아레이트, 경화유

### 주의

본제는 생약을 원료로 사용하고 있으므로 제품에 따라 색조 등에 다소 차이가 있을 수 있으나, 효과는 변함 없습니다.

### 사용상의 주의

#### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오  
의사의 치료를 받고 있는 사람.  
고령자.  
다음의 증상이 있는 사람.  
부종  
다음의 진단을 받은 사람.  
고혈압, 신장병, 심장병
- 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오  
피부: 발진·발적, 가려움
- 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.  
간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.  
가성 부신 질환, 근육병: 손발의 나른함, 저림, 당김과 경직에 더해 탈력감, 근육통이 나타나며 점차 심해진다.
- 1 개월 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않을 경우에는 복용을 중단하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록 판매자와 상담하십시오
- 장기간 계속해서 사용하는 경우는 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

### 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 6개월 이내에 복용하십시오.(품질유지를 위하여)

**【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】**

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.