

TAISHO STOMACH MEDICINE K <TABLETS>

- TAISHO STOMACH MEDICINE K <TABLETS> 是用芍藥甘草湯萃取物與安中散調配而成的腸胃藥。
- 含上述 2 大配方的 TAISHO STOMACH MEDICINE K <TABLETS> 有效緩解胃痛、胃飽脹、胃炎等各種腸胃症狀。

療效

胃痛、胃脹、胃炎、胃部不適、食慾不振、打嗝、腹痛、胸口灼熱、噁心、胃酸過多、腹部膨脹感

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用。

15 歲以上，1 次 4 片，1 天 3 次

5 歲~14 歲，1 次 2 片，1 天 3 次

未滿 5 歲者，請勿服用

餐間服用時，約以餐後 2~3 小時為宜。

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。(可能造成變色等影響品質)

成分

4 片中

安中散 700mg

(桂枝 200mg, 延胡索 150mg, 牡蠣 150mg, 茴香 75mg, 縮沙 50mg, 甘草 50mg, 良薑 25mg)

芍藥甘草湯香 170mg

(芍藥 340mg, 甘草 340mg)

添加劑

羥丙基纖維素，二氧化矽，乳糖，硬脂酸鎂，硬化油

注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

年長者。

有下列症狀的人。

浮腫

接受過下列診斷的人。

高血壓，腎臟病，心臟病

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢

- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。

- 如果服用 1 個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜同本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- 長期連續服用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(為確保品質)

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。