

TAISHO STOMACH MEDICINE G, 从胃酸保护胃, 通过中和和分泌抑制控制胃酸, 对胃酸逆流等引起的烧心, 胃痛发挥效果。
有清凉感的清爽服用感。

效能或效果

烧心、胃痛、胃酸过多、胃部不适感、恶心（反胃、宿醉与醉酒想吐、呕吐）、饮酒过量、胃部胀满感、胃胀、胃重、胸闷、打嗝、呕吐

用法及用量

在饭间或入睡前, 请按以下用量并配合水或温开水服用:

15岁以上, 1天3次, 1次1包

未满15岁, 不宜服用

〔注意〕

请严格遵守规定的用法用量。

成分及分量

1包 (1.3g) 中

Sodium bicarbonate 200mg

Magnesium Aluminosilicate 300mg

Scopolia Extract 3 times scattered 30mg (Scopolia Extract10mg)

Sofalcone 100mg

添加剂

Corn starch,calcium hydrogen phosphate,D-Mannitol ,Potato starch,Hypromellose,Polysorbate 80,flavor,Starch sodium octenyl succinate,Reduced maltose syrup,Hydroxypropylcellulose,l-Menthol

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化, 或容易出现副作用)

- 下述人群不要服用
接受透析疗法的人群。
- 在服用本药剂期间, 不要服用下述医药品
肠胃镇痛镇痉药 (减轻肠胃痛感的药物)
- 处于哺乳期时不要服用本药剂, 或在服用本药剂时不要进行哺乳 (可能会因转移至母乳中导致婴儿脉搏加快)
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医生治疗的人群。(可能会影响医生处方的药物或也有可能使用与本药剂相同的药物)
孕妇或有其可能性的人群(孕妇或有其可能性的女性必须谨慎服用药物)
老年人[一般大多数老年人(65岁以上)的生理功能正在衰退, 因此需要注意。]
因药物等引起过过敏症状的人群。(对药物等有过敏症状的人, 用本药剂也有可能过敏。)
拥有以下症状的人群
排尿困难(患有前列腺肥大或排尿障碍的人群, 用Scopolia extract可能会加重排尿困难)
接受以下诊断的人群
肾脏病 (配方成分中也有从肾脏会排出的成分)
心脏病 (Scopolia extract可能会引起心率加快、或心脏怦怦跳)
青光眼 [Scopolia extract可能会使青光眼的症状 (比如眼睛痛、视线模糊等) 恶化]
正在服用其他药剂的人群。
(有可能会对同时服用的其他药剂的有效性或安全性产生影响)
 - 服用后若出现下述症状, 则可能存在副作用, 此时应立即中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤: 起疹、发红、发痒☆
(☆出现过敏症状时, 早期处理很重要)
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
- 肝功能障碍: 出现发烧、发痒、起疹、黄疸 (皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
- 服用后若出现下述症状, 若症状持续或加重时应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
口腔干燥、便秘、腹泻、烧心
 - 若服用2周左右后症状仍无改善则应中止服用, 并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
(服用2周时间仍不见症状改善时, 也有可能是其他疾病, 因此请不要一直服用)

其他注意事项

有可能难以分泌母乳。

服用本药剂, 有可能出现视线模糊、异常眩晕等症状, 因此进行交通工具或机械类的驾驶操作时应注意。

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
请勿服用超过使用期限的产品。

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任