

TAISHO STOMACH MEDICINE G, 從胃酸保護胃, 通過中和和分泌抑制控制胃酸, 對胃酸逆流等引起的燒心, 胃痛發揮效果。
有清涼感的清爽服用感。

療效或效果

胸口灼熱、胃痛、胃酸過多、胃部不適、噁心（反胃、宿醉與酩酊大醉想吐、作嘔）、飲酒過量、胃部膨脹感、胃脹、胃重、胸悶、打嗝、嘔吐

用法及用量

請將以下用量於餐與餐之間或睡前用冷水或微溫水服用：

15歲以上, 1天3次, 1次1包

未滿15歲者, 請勿服用

〔注意事項〕

請務必遵守規定用法、用量。

成分及分量

1包(1.3g)中

Sodium bicarbonate 200mg

Magnesium Aluminosilicate 300mg

Scopolia Extract 3 times scattered 30mg (Scopolia Extract10mg)

Sofalcone 100mg

添加劑

Corn starch,calcium hydrogen phosphate,D-Mannitol ,Potato starch,Hypromellose,Polysorbate 80,flavor,Starch sodium octenyl succinate,Reduced maltose syrup,Hydroxypropylcellulose,l-Menthol

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守, 現在的症狀會惡化, 或者容易引發副作用)

●下列的人請勿服用

正在接受透析療法的人。

●服用本藥劑的期間, 請勿服用下列醫藥品。

胃腸鎮痛鎮痙藥(抑制腸胃疼痛的藥物)

●正在哺乳的人請勿服用本藥劑, 或者服用本藥劑的情況下, 請避免哺乳(本藥劑可能會經由母乳, 使嬰兒的脈搏變快。)

●請勿長期連續服用

諮詢事項

●下列的人於服用前, 請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫生治療者。(可能影響醫師的處方用藥或使用與本藥劑成分相同的藥物)

孕婦或可能懷孕的人。(孕婦或可能懷孕者應謹慎用藥)

年長者。[一般而言, 老年人(65歲以上)生理機能衰退, 因此需要特別注意。]

曾因藥物等引發過敏症狀者。(曾因藥物等引發過敏症狀者使用本藥劑亦可能造成過敏反應。)

有下列症狀的人。

排尿困難(Scopolia extract成分可能使因前列腺肥大而排尿困難者更不易排尿)

接受過下列診斷的人。

腎臟病(配方含有須經腎臟代謝的成分)

心臟病(Scopolia extract成分可能導致脈搏加快、心臟劇烈跳動)

青光眼[Scopolia extract成分可能導致青光眼症狀(例如眼睛疼痛、視力模糊等)惡化]

現正服用其他藥物者。

(可能影響同時服用的其他藥物的療效與安全性)

●服用後, 出現下列症狀的情況下, 有可能是副作用, 請立刻停止服用, 攜帶此文件, 諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚: 發疹、發紅、發癢☆

(☆出現過敏症狀時及早進行處置相當重要)

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下, 請立刻接受醫師的診療。

肝功能障礙: 出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

●服用後, 可能出現下列症狀, 這種症狀持續或變嚴重的情況下, 請停止服用, 攜帶此文件, 諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

口乾、便秘、腹瀉、胸口灼熱

●即使服用2週左右, 症狀也沒有改善的情況下, 請停止服用, 攜帶此文件, 諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

(如服用2週症狀仍未見改善則可能罹患其他疾病, 因此請勿持續服用)

其他注意事項

可能不易分泌母乳。

服用本藥劑可能出現視力模糊、異常目眩等症狀, 因此駕駛操作交通工具或機械類時請特別注意。

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
請勿服用超過使用期限的產品。

11

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。