

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>大正胃腸薬 バランサー</b>
2	成分・分量	1包(1.2g)中 ビオチン 2000 30mg プロザイム 6 6.7mg(3包中 20mg) リパーゼ AP6 30mg ケイヒ末 133.3mg(3包中 400mg) ショウキョウ末 15mg ソウジュツ末 15mg コウボク末 15mg チンピ末 15mg 合成ヒドロタルサイト 300mg 炭酸水素ナトリウム 150mg
3	用法・用量	次の量を1日3回、食間又は食後に水又はぬるま湯で服用してください。 成人(15才以上) 1回1包、11才~14才 1回2/3包、8才~10才 1回1/2包、 5才~7才 1回1/3包、3才~4才 1回1/4包、3才未満 服用しないこと
4	効能・効果	消化不良、消化促進、胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、食欲不振(食欲減退)、胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ、胃部・腹部膨満感、胃重、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、胸つかえ、嘔吐、胃弱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。 2. 長期連用しないでください 3. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人。 腎臓病  【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。