

TAISHO STOMACH MEDICINE BLANCER是消化酵素帮助消化，健胃生药调节肠胃机能，改善因停留在胃里的脂肪等引起的消化不良和胃积液。有清凉感的清爽服用感。

效能或效果

消化不良、促进消化、胃胀、吃得过多、饮酒过量、食欲不振（食欲减退）、烧心、胃痛、胃酸过多、胃部不适、打嗝、胃部腹部胀满感、胃重、恶心（反胃、宿醉与醉酒想吐、呕吐、恶心）、胸闷、呕吐、胃弱

用法及用量

在饭间或饭后，请按以下用量并配合水或温开水服用：

15岁以上，1天3次，1次1包
11岁~14岁，1天3次，1次2/3包
8岁~10岁，1天3次，1次1/2包
5岁~7岁，1天3次，1次1/3包
3岁~4岁，1天3次，1次1/4包
未满3岁，不宜服用

〔注意〕

请严格遵守规定的用法用量。
儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分及分量

1包（1.2g）中
Biodiastase2000 30mg
Prozyme6 6.7mg
Lipase AP6 30mg
Powdered Cinnamon Bark 133.3mg
Powdered Ginger 15mg
Powdered Atractylodes Lancea Rhizome 15mg
Powdered Magnolia Bark 15mg
Powdered Citrus Unshiu Peel 15mg
Hydrotalcite 300mg
Sodium bicarbonate 150mg

添加剂

D-Sorbitol ,D-Mannitol ,Hydroxypropylcellulose,l-Menthol,flavor,Propylene glycol,Carboxymethylcellulose,Corn starch ,Lactose ,Polysorbate 80,Talc,Silicon dioxide

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群不要服用
接受透析疗法的人群。
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
接受以下诊断的人群

- 肾脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红、发痒
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
便秘、腹泻
- 若服用2周左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
将1包分开服用时，折叠袋口进行保管，并在2天之内服用。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任