

TAISHO STOMACH MEDICINE BLANCER是消化酵素幫助消化，健胃生藥調節腸胃機能，改善因停留在胃里的脂肪等引起的消化不良和胃積液。有清涼感的清爽服用感。

療效或效果

促進消化、胸口灼熱、消化不良、暴飲暴食、胃脹、食慾不振（食慾減少）、打嗝、胃痛、胃酸過多、胃部不適感、打嗝、胃部及腹部膨脹感、胃重、噁心（反胃、宿醉與酪酐大醉想吐、作嘔、噁心）、胸悶、嘔吐、胃弱

用法及用量

請將以下用量於餐與餐之間或餐後用冷水或微溫水服用：

- 15歲以上，1天3次，1次1包
- 11歲~14歲，1天3次，1次2/3包
- 8歲~10歲，1天3次，1次1/2包
- 5歲~7歲，1天3次，1次1/3包
- 3歲~4歲，1天3次，1次1/4包
- 未滿3歲者，請勿服用

〔注意事項〕

請務必遵守規定用法、用量。
兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

成分及分量

- 1包（1.2 g）中
- Biodiastase2000 30mg
- Prozyme6 6.7mg
- Lipase AP6 30mg
- Powdered Cinnamon Bark 133.3mg
- Powdered Ginger 15mg
- Powdered Atractylodes Lancea Rhizome 15mg
- Powdered Magnolia Bark 15mg
- Powdered Citrus Unshiu Peel 15mg
- Hydrotalcite 300mg
- Sodium bicarbonate 150mg

添加劑

D-Sorbitol ,D-Mannitol ,Hydroxypropylcellulose,l-Menthol,flavor,Propylene glycol,Carboxymethylcellulose,Corn starch ,Lactose ,Polysorbate 80,Talc,Silicon dioxide

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 下列的人請勿服用
正在接受透析療法的人。
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
接受過下列診斷的人。
腎臟病
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：發疹、發紅、發癢
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
便秘、腹瀉
- 即使服用2週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。