

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>大正胃腸薬P</b>
2	成分・分量	1 カプセル中 チキジウム臭化物 5mg
3	用法・用量	次の量を1日3回まで、水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は5時間以上おいてください。 成人(15才以上) 1カプセル 15才未満 服用しないこと
4	効能・効果	胃痛、腹痛、さしこみ(腹部疝痛) (本剤は、胃腸の緊張をやわらげる成分を含んでいます)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください           <ol style="list-style-type: none"> <li>本剤、本剤の成分又は他の胃腸鎮痛鎮痙薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>次の診断を受けた人。(症状を悪化させることがあります) 緑内障、前立腺肥大、心臓病、麻痺性イレウス(腸閉塞)、甲状腺機能亢進症、不整脈、潰瘍性大腸炎</li> </ol> </li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)</li> <li>次に該当する人はお申し出ください           <ul style="list-style-type: none"> <li>医師の治療を受けている人又は他の医薬品を使用している人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>授乳中の人。</li> <li>高齢者、体の弱っている人。</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>次の症状のある人。 排尿困難</li> </ul> </li> <li>本剤の服用により汗が出にくくなることもあるため、高温下での作業等をさけてください。</li> </ol>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。