

# 大正胃腸薬P

大正胃腸薬Pは、胃酸の分泌を抑制しつつ、胃腸の過剰な動きを抑えることで、突然のキリキリとした胃痛・腹痛に効きます。服用しやすい小型のカプセル剤で、食前食後に関係なく、痛みを感じたときに服用でき、1回1カプセルで効果を示します。

## 効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ（腹部疝痛）  
（本剤は、胃腸の緊張をやわらげる成分を含んでいます）

## 用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。  
服用間隔は5時間以上おいてください。  
成人(15才以上)、1回1カプセル、1日3回まで  
15才未満、服用しないこと

## 注意

定められた用法・用量を厳守してください。  
服用後、数時間たっても激痛がおさまらない場合※や、5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

・カプセルの取り出し方

・カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

※他の重篤な疾患【穿孔（胃腸に穴があく）、ヘルニア嵌頓（正常位置から脱出した腸がもとにもどらず、腸閉塞症状を呈する）等】の可能性ががあります

## 成分及び分量

1カプセル中  
チキジウム臭化物 5mg

## 添加物

乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na

## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

● 次の人は服用しないでください

本剤、本剤の成分又は他の胃腸鎮痛鎮痙薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の診断を受けた人。[症状を悪化させることがあります]

緑内障、前立腺肥大、心臓病、麻痺性イレウス（腸閉塞）、甲状腺機能亢進症、不整脈、潰瘍性大腸炎

● 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

● 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）

## 相談すること

● 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

医師の治療を受けている人又は他の医薬品を使用している人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

授乳中の人。

高齢者。体の弱っている人

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の症状のある人。

排尿困難

● 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、胸やけ（胃食道逆流症）

精神神経系：頭痛、頭重感

その他：顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難、頻尿、動悸、耳なり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

● 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師

又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ

●服用後、数時間たっても激痛がおさまらない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
〔他の重篤な疾患〔穿孔（胃腸に穴があく）、ヘルニア嵌頓（正常位置から脱出した腸がもとにもどらず、腸閉塞症状を呈する）等〕の可能性がありま  
す〕

●5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●症状の改善がみられても服用期間が1週間を超える場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
（他の胃腸疾患を見過ごすおそれがあるので、漫然と服用しないでください）

## その他の注意

本剤の服用により汗が出にくくなることがあるため、高温下での作業等をさけてください

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

11

### 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。